

Hilmarsson

Über Hydramnion.

(127 Fälle aus der Breslauer Universitäts-Frauenklinik.)

(Direktor Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Küstner.)

Inaugural-Dissertation

der

Hohen medizinischen Fakultät der Schlesischen
Friedrich Wilhelms-Universität zu Breslau

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin und Chirurgie


vorgelegt von

Czeslaus Stelmachowski,

approb. Arzt.

Breslau 1912.

Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, E. G. m. b. H.



**Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Breslau.**

Referent: Professor Dr. Küstner.

Meinem lieben Vater

und dem

Andenken meiner teuren Mutter

Von Hydramnion oder abnormer Vermehrung des Fruchtwassers pflegen wir zu sprechen, wenn die Flüssigkeitsmenge $\frac{1}{2}$ —1 Liter wesentlich überschreitet. Wie weit die Ansichten über die normale Fruchtwassermenge auseinandergehen, dafür mögen nachstehende Zahlen ein Zeugnis abgeben. So beträgt die Durchschnittsmenge des normalen Fruchtwassers nach Schröder 500 g, nach Fehling 680 g, nach Winkel 1300 g, nach Gaßner sogar 1870 g. — Während die meisten Fälle von Hydramnion sich chronisch entwickeln und die zweite Hälfte der Gravidität bevorzugen, kommt es in selteneren Fällen, besonders aber bei eineiigen Zwillingen zu einer auffallend raschen Hydramnionbildung, dem akuten Hydramnion, das meist Multipare im 4., 5. oder 6. Schwangerschaftsmonat befällt. Da nun chemische und mikroskopische Untersuchungen keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Fruchtwasser in seiner normalen Menge und der Hydramnionflüssigkeit ergeben haben, und da für beide im allgemeinen dieselben Quellen angenommen werden, scheint es mir nicht unberechtigt, hier einige Anschauungen über das Entstehen des Fruchtwassers in seiner normalen Menge wiederzugeben. Nach ihren Ansichten lassen sich die Forscher in 3 Gruppen einteilen, von denen die eine das Fruchtwasser als Produkt des mütterlichen Kreislaufes ansieht, die zweite die Fruchtwasserbildung dem Fötus allein zuschreibt, die dritte endlich sich sowohl für die Beteiligung des mütterlichen Kreislaufes wie des Fötus an dem Zustandekommen des Fruchtwassers ausspricht.

Unter den Vertretern dieser Gruppe finden wir Zuntz (Pflügers Arch. Bd. XVI), dem es gelang, einen in die Vena

jugularis des Muttertieres injezierten Farbstoff wohl im Fruchtwasser, nicht aber in der Frucht selbst nachzuweisen. Zuntz hatte zu diesem Zweck einmal die Frucht vor der Injektion abgetötet, ein zweites Mal wieder am Leben gelassen. Auf Grund dieser Versuche kam Zuntz zu dem Resultat, daß Substanzen aus dem mütterlichen Blute in das Fruchtwasser wohl übergehen können, ohne den fötalen Körper durchströmt zu haben, daß mindestens also ein Teil des Fruchtwassers sicher aus dem mütterlichen Blute herkomme. — Auch Winkler spricht sich für den mütterlichen Kreislauf als Quelle des Fruchtwassers aus und verlegt den Ort der Transsudation nach der mütterlichen Decidua. Für ein reines Transsudat des mütterlichen Blutes erklären das Fruchtwasser weiterhin auch Abelfeld und Fehling (Arch. f. Gyn. Bd. XI, XIII und XIV). Beide stellen zwar eine Tätigkeit der fötalen Nieren nicht in Abrede, wollen jedoch einer Entleerung des fötalen Harnes in das Fruchtwasser keinen Glauben schenken.

Jungbluth (Inaug.-Diss. Bonn 1869) verlegt den Ort der Transsudation in die Vasa propria, ein von ihm nachgewiesenes feines Kapillarnetz, das in der dem Amnion dicht anliegenden Grenzmembran der fötalen Plazenta gelegen ist. — Mit Jungbluth stimmt Spiegelberg (Lehrbuch d. Geburtshilfe 1878) insofern überein, als auch er in den ersten Graviditätsmonaten für den mütterlichen Kreislauf als Quell des Fruchtwassers durch Vermittelung der Jungbluthschen Vasa propria eintritt, während er etwa vom 8. Graviditätsmonat, um welche Zeit die bei Hydramnion offenbleibenden Vasa propria normalerweise obliterieren, die fötalen Nieren als Fruchtwasserbildner erklärt. Eine Stütze für seine Anschauung sieht Spiegelberg in der stetigen Zunahme der absoluten Fruchtwassermenge in den letzten Graviditätsmonaten, in der Abnahme des Albumens und der Zunahme des Harnstoffes um diese Zeit.

Für ein ausschließlich fötales Produkt wird das Fruchtwasser von Gusserow (Arch. f. Gyn. Bd. III) erklärt, welcher der Meinung ist, daß dasselbe in den ersten Monaten aus

dem Transsudat der fötalen Haut, später durch Harnsekretion der Frucht gebildet werde. Dieser von Gusserow ausgesprochenen Meinung schließt sich Prochownik (Arch. f. Gyn. Bd. XI) voll und ganz an, der durch zahlreiche chemische Untersuchungen des menschlichen Fruchtwassers zu diesem Resultat gelangte. Während die beiden letzten Autoren in dem Fruchtwasser der ersten Graviditätsmonate ein Transsudat der fötalen Haut erblicken, spricht Nagel (Arch. f. Gyn. Bd. XXXV) auf Grund seiner anatomischen Befunde der Urniere bereits in der ersten Schwangerschaftszeit dieselbe Bedeutung für die Frucht zu, wie sie die Niere zu einer späteren Zeit des intra- und während des ganzen extrauterinen Lebens besitzt, nimmt also bereits für die ersten Monate der Gravidität eine Sekretion der Urniere in die Amnionflüssigkeit an.

Schatz (Arch. f. Gyn. Bd. XI), welcher das Fruchtwasser für ein reines Produkt fötalen Stoffwechsels hält, betont besonders, daß „die Natur in den eineiigen Zwillingen mit einseitigem Hydramnion uns ein Experiment an die Hand gibt, wie wir es selbst gar nicht nachahmen können. Denn wenn das Fruchtwasser aus dem mütterlichen Blute stammt, so liegt kein Grund vor, weshalb in diesen Fällen nur der eine Eisack Hydramnion, der andere aber eine sehr geringe Fruchtwassermenge aufweist“.

Für ein zusammengesetztes Produkt aus mütterlichem Transsudat und fötalem Nierensekret wird das Fruchtwasser von Bar (Thèse de Paris 1881, Centralblatt f. Gyn. Bd. VII), von Döderlein (Arch. f. Gyn. Bd. XXXV), von Schröder (Lehrbuch d. Geburtshilfe 1893) und Virchow gehalten. —

Wenden wir uns nun zur Ätiologie des Hydramnion und suchen wir zunächst einmal die Quellen der vermehrten Fruchtwassermenge im mütterlichen Körper, so finden wir, daß durch Herz- und Nierenerkrankungen bedingte Kreislaufstörungen der Mutter, wie sie sich im Anasarka und Höhlenhydrops manifestieren, ebenfalls auch zur erhöhten Transsudation von der Decidua aus nach der Amnionhöhle

hin führen und so Ursache der Hydramnionbildung werden. Als weitere für Hydramnion in Betracht kommende Quellen gelten Lues, schwere anämische und leukämische Zustände der Mutter, Krankheiten, die durch Alteration der Gefäßwandungen und hydropische Beschaffung des Blutes den Austritt von Flüssigkeit nach der Amnionhöhle sehr wohl begünstigen können. — Endlich geben auch entzündliche Prozesse der mütterlichen Plazenta und Decidua Veranlassung zu einer wahrscheinlich auf aktiver Zellentätigkeit beruhenden, vermehrten Transsudation nach der Eihöhle hin.

Ähnlich wie im mütterlichen Organismus wirken auch Zirkulationsstörungen im fötalen Körper, namentlich wenn sie zu Stauungen in den venösen Bahnen führen. Hydramnionbildung infolge erhöhter Transsudation aus der dünnwandigen Nabelvene und deren plazentaren Verästelung ist dann unbedingte Folge. Eine häufige Ursache solcher Zirkulationsstörungen im Bereich der venösen Bahnen bietet die syphilitische Hepatitis interstitialis, bei welcher es zu einer starken Neubildung von Bindegewebe kommt, das, von spindelförmigen und runden Zellen reich durchsetzt, sich ganz besonders in unmittelbarer Nähe der Pfortaderäste vorfindet. Durch Kompression dieser Gefäße und häufig gleichzeitige Verlegung des Ductus Arantii kommt es zu Aszites und zur Erschwerung des Abflusses aus der Nabelvene und hiermit zur Stauung, Ödem von Nabelschnur und Plazenta, erhöhter Transsudation und Hydramnionbildung.

In ähnlicher Weise führt auch zur abnormen Vermehrung des Liquor Amnii die angeborene Stenose des Ostium Aortae (Lebedeff), wie frühzeitige Obliteration des Ductus Botalli. Nieberding, welcher im Archiv f. Gyn. Bd. XX zwei Fälle von Hydramnion infolge von Obliteration des Duktus Botalli erwähnt, sieht in dieser Obliteration das Anfangsglied in der Kette der pathologischen Organveränderungen, die sich in Hypertrophie des rechten und linken Herzventrikels, Dilatation der Lungengefäße, Vergrößerung der Nieren, Erweiterung der Nierenbecken

äußern. Die Hypertrophie des linken Ventrikels führt nun nach Nieberding zu einer Steigerung des arteriellen Druckes und hiermit zur Erhöhung der fötalen Diurese, welche das Hydramnion entstehen läßt.

Von weiteren zur Stauung im fötalen Kreislauf und zu Hydramnion führenden Erkrankungen wären fötale Peritonitis und Anomalien der Nabelschnur und ihrer Insertion zu verzeichnen. So wurden von Küstner, Fehling und Schauta multiple Windungen der Nabelschnur, von Leopold und Budin Stenose der Nabelvene, von Bar Entzündung und Thrombose der Nabelvene, von van der Hoefen wahre Knoten der Nabelschnur als Ursache der Hydramnionbildung gefunden. Unter den Anomalien der Nabelschnurinsertion soll nach Küstner die Insertio velamentosa für das Zustandekommen des Hydramnion besonders bei ein-eiigen Zwillingen von wesentlicher Bedeutung sein.

Auf Entzündungsprozesse des Amnion als weiteres für Hydramnion wichtiges ätiologisches Moment sind wir durch Ahlfeld (Berichte und Arbeiten Bd. II) hingewiesen worden. Als Zeichen dieser Entzündung finden sich häufig abnorme Verwachsungen zwischen Amnion und der fötalen Oberfläche, wie unter den einzelnen Teilen der Amnionhülle. Mikroskopisch konnte Ahlfeld in solchen Fällen nachweisen, daß die Zellen ein- bis mehrkörnig, sehr klein und lückenhaft waren. Die Ursache der Hydramnionbildung sieht Ahlfeld hier in einer exsudativen Entzündung der Amnioninnenfläche.

Recht auffallend ist weiterhin die Häufigkeit des gleichzeitigen Vorkommens von Hydramnion mit fötaler Mißbildung wie Hydrocephalie, Hemicephalie, Anencephalie, Spina bifida, Rhachischisis, Hasenscharte, Wolfsrachen, kongenitale Struma, Atresia ani, Phimose, Epi- und Hypospadie, Syndaktylie, Deformitäten der Gelenke und dergl. mehr. Möglicherweise liegt auch in vielen Fällen der Mißbildung wie dem Hydramnion dieselbe Ursache zugrunde. — Greifen wir aus der nicht unerheblichen Zahl

der Mißbildungen eine der häufigsten, den Hydrocephalus, heraus, so können wir uns das Zustandekommen des Hydramnion wie folgt vorstellen: Durch die in den Gehirnv ventrikeln pathologisch vermehrte Flüssigkeit wird ein abnorm hoher Druck auf die Gehirns substanz und ihre Umgebung erzeugt, wodurch die Blutzufuhr durch die Karotiden erschwert und daselbst eine Stauung hervorgerufen wird, die sich auf Aorta, den linken Ventrikel, den linken Vorhof fortpflanzt, um von hier durch das foramen ovale auf den rechten Vorhof, die Vena Cava inferior, die Pfortader, den Ductus Venosus Arantii und die Nabelvene überzugreifen. Infolge der gleichzeitigen Druckerhöhung bleibt die normalerweise in den letzten Graviditätsmonaten eintretende Obliteration der Jungbluthischen Vasa propria aus, durch welche nun eine Transsudation nach der Eihöhle und hiermit die Bildung des Hydramnion stattfindet. Mannigfach sind die Erklärungen, welche über das recht häufige Zusammentreffen von Hydramnion mit Hemicephalie, Anencephalie und Spina bifida gegeben werden. So rechnen die einen mit der Möglichkeit, daß hier durch einen der Pikure analogen Reiz auf den Boden des freiliegenden IV. Ventrikels reflektorisch eine erhöhte Urinsekretion veranlaßt wird, die das Hydramnion entstehen läßt. Andere wiederum erklären sich den Vorgang so, daß durch den Defekt ein mehr oder weniger großer Bezirk der fötalen Blutversorgung ausfällt. „Wenn nun“, so schreibt Wanser (Inaug.-Diss. Tübingen), „keine Abnormitäten der Plazenta vorhanden sind, ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß der Fötus deswegen auch schon von vornherein weniger Blut erhalte. Durch die wirkliche Plethora aber wird an das fötale Herz, hauptsächlich an den linken Ventrikel ein stärkerer Anspruch gestellt und dasselbe wird bald hypertrophieren“. Infolge dieser Hypertrophie findet eine Steigerung des arteriellen Blutdruckes und gleichzeitige Zunahme der fötalen Diurese statt, die zur Quelle des Hydramnion wird. — Wahrscheinlicher jedoch ist die Ursache für die verschiedenen Formen von Spaltbildung mit

gleichzeitigem Hydramnion in der oberflächlichen Lage der einer epithelialen Bedeckung entbehrenden Gefäße zu suchen, die eine stärkere Transsudation nach der Amnionhöhle hin gestattet.

Inwieweit die Annahme einer besonderen Ätiologie für das Zusammentreffen von Hydramnion mit eineiigen Zwillingen berechtigt ist, darüber wird erst die Zukunft zu entscheiden haben. Zurzeit sind die diesbezüglich gefällten Urteile noch sehr verschieden. Tatsache bleibt es, daß dieses Zusammentreffen recht häufig beobachtet wird, daß gerade hier das Hydramnion nicht selten in seiner akuten Form aufzutreten pflegt und daß fast stets nur der eine Zwilling polyhydramniotisch ist, während der andere häufig zu wenig Fruchtwasser besitzt. Sicher überflüssig ist es, die Ursache hierfür im mütterlichen Körper suchen zu wollen, da ja sonst beide Zwillinge dieselbe Anomalie aufweisen müßten. Von den verschiedenen Erklärungen über den Zusammenhang von Hydramnion und eineiigen Zwillingen mögen hier nur die wichtigsten erwähnt werden. — Von der Annahme eines dritten Kreislaufes ausgehend, gibt Schatz folgende Erklärung: „Die den eineiigen Zwillingen gemeinsame Plazenta zeigt entsprechend den zwei Nabelschnüren zwei besondere Plazentarkreisläufe. Mehrere Kotyledonen aber, welche zwischen beiden liegen, sind beiden Plazentarkreisläufen gemeinsam, indem die Arterien des einen ihr Blut durch die Zottenkapillaren hindurch zu den Venen des anderen führen und umgekehrt, oder es bestehen wenigstens solche Kommunikationen der beiderseitigen Gefäße, daß das Blut der Arterien der einen Nabelschnur nicht vollständig in die Vene desselben Plazentarkreislaufes zurück, sondern teilweise zugleich in die Venen des anderen Kreislaufes gelangt und umgekehrt. Das Blut, welches in dem so erzeugten gemeinschaftlichen dritten Plazentarkreislaufe kreist, läuft durch die Herzen beider Zwillinge und hält deren Blut beständig in einerlei Zusammensetzung. Hat nun der eine Zwilling bei einer ungleichmäßigen Anlage dieses ge-

meinsamen dritten Plazentarkreislaufes einen bequemerem arteriellen Zugang zu demselben, so kann er seinem Zwillingsbruder mehr Blut transfundieren, als er von diesem vermöge dessen schwerem arteriellen Zugang zum dritten Kreisläufe erhält; der letztere wird dadurch plethorisch, sein Herz hypertrophisch. Der infolgedessen gesteigerte Blutdruck hat raschere Zirkulation in den Nieren und stärkere Urinsekretion zur Folge, dadurch wird das gemeinschaftliche Blut beständig so schnell von seinen zur Ausscheidung bestimmten Substanzen befreit, daß sich im Zwilling mit nicht hypertrophischem Herzen gar nicht genug harnfähige Substanzen ansammeln konnten, um bei dem geringen arteriellen Drucke die Urinsekretion anzuregen. So zieht die Polyurie des einen Zwillings die Oligurie des anderen nach sich.“ Diese Polyurie im Verein mit fötaler Hautsekretion führt nun nach Schatz zur Polyhydramnie des einen Zwillings, während der andere infolge seiner Oligurie olighydramniotisch wird.

Auch Küstner hält den beiden Zwillingen gemeinsamen Plazentarbezirk für bedeutungsvoll, betont jedoch, daß die Herzhypertrophie beim plethorischen Zwilling schließlich einen derartigen Grad erreichen müsse, der eine weitere Störung der Zirkulation zur Folge haben muß. Nach Küstner ist in erster Linie der Ort und die Art und Weise der Plazentabildung, die häufig dem einen Zwilling für sein Wachstum weit bessere Chancen liefert, als dem anderen, von Bedeutung. „So sei es z. B. ein großer Unterschied, ob der Verlauf der Nabelschnurgefäße zur Plazenta ein gestreckter sei, oder ob derselbe erst auf Umwegen zustande komme, z. B. wegen einer bestehenden Insertio velamentosa. In solchem Fall sei wohl der Zufluß des Fötalblutes durch die Nabelschnurarterien zur Plazenta, als auch der Abfluß aus dieser in die Nabelschnurvene leichter in der Eihälfte mit plazentarer als der mit velamentarer Insertion. Die für den einen Fötus günstige Lage des einen Plazentarbezirks müsse es bald zur Folge haben, daß der zugehörige Fötus sich in schnellerem Tempo ent-

wickele, als der andere. Das Herz des ersteren werde bald dem des anderen, wenn auch zunächst um noch so wenig überlegen sein, und so würde es kommen, daß, während einerseits der venöse Abfluß nach dem stärkeren Herzen zu erleichtert sei, dieses die arterielle Welle immer weiter in das Plazentargebiet des schwächeren Fötus hinein vorschicke und sich allmählich die ursprünglich dem schwächeren Fötus angehörigen Kotyledonen aneigne. Auf diese Weise werde der schwächere Fötus nach und nach ganz aus dem gemeinsamen Plazentargebiet verdrängt. Dasjenige Organ nun, das bei dem geschilderten Manöver besonders tätig und in Anspruch genommen ist, sei das Herz, das infolgedessen zu unverhältnismäßiger Größe hypertrophiere. Eine Folge dieser Hypertrophie sei natürlich erhöhter arterieller Blutdruck verbunden mit vermehrter Urinsekretion in dem Amnionsack hinein. Schließlich aber komme es, da das schon bis zum Übermaß hypertrophierte Herz seiner immer noch wachsenden Aufgabe nicht mehr genügen könne, zur relativen Herzinsuffizienz, die ihren Ausdruck finde in den Erscheinungen des erhöhten Druckes und der Stase im Venensystem, in Ödemen und vermehrter Transsudation in den Amnionsack hinein. Bei hinreichend langer Dauer der Druckerhöhung im Venensystem entwickele sich Lebercyanose und schließlich Lebercirrhose; auch durch diese beiden Momente werde wiederum die Transsudation in den Amnionsack hinein begünstigt.“

Ahlfeld findet in der von Schatz aufgestellten Theorie über die Existenz eines dritten Kreislaufes keine Erklärung für das akute Auftreten von Hydramnion, ferner erblickt er in der großen kommunizierenden Sinus der Plazenta keine erheblichen Hindernisse für die Vermischung des beiderseitigen Blutes. Seine Behauptung, daß Hydramnion bei eineiigen Zwillingen unter denselben Verhältnissen vorkomme, wie bei jeder einzelnen Frucht, findet in den beiden von Nieberding veröffentlichten Hydramnionfällen eine gewisse Stütze, der beide Male als Ursache des

Hydramnion eine Obliteration des Ductus Botalli fand und zwar einmal bei eineiigen Zwillingen, ein zweites Mal bei einer Einzelfrucht.

Auf der geburtshilflichen Abteilung der Breslauer Universitäts-Frauenklinik wurden in der Zeit vom 1. November 1893 bis zum 1. April 1911 klinisch und poliklinisch 127 Fälle von Hydramnion beobachtet. Der besseren Übersicht wegen möge es mir gestattet sein, dieselben in tabellarischer Zusammenstellung vorzuführen.

Tabellarische Übersicht

der in der Zeit

vom 1. November 1893 bis zum 1. April 1911

beobachteten Hydramnionfälle.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
1.	172 1894/95	Fr. A. L.	48 J.	XV	Hereditär = 0. Als Kind Masern u. Scharlach durchgemacht, sonst immer gesund gewesen. Erste Menses mit 24 Jahren, dann stets regelmäßig o. Bes. Letzte Menses unbekannt. 9 Kinder wurden mit Kunsthilfe geboren, bei der X, XI und XII Gravidität erfolgte Abortus im 3.—5. Monat. Seit 4 Wochen erhebliche Kreuzschmerzen.	Hängebauch. Leibesumfang in Nabelhöhe 129 cm. Ödem der Beine, der Vulva u. Bauchhaut. Im Uterus Albumen u. Zylinder. Im Bereich des Uterus Fluktuation. — Palpatorischer Befund, kindliche Herztöne nicht deutlich.
2.	445 1894/95	Fr. P. C.	24 J.	V	Hereditär = 0. Will stets gesund gewesen sein. Erste Menses unbekannt, letzte Mitte März 1894. Menses waren immer regelmäßig, o. Bes. Frühere Geburten erfolgten spontan. Die letzte war eine Frühgeburt, Kind ist am Leben geblieben.	Leib stark aufgetrieben. Sein Umfang in Nabelhöhe 115 cm. Starkes Ödem der Beine u. Bauchhaut. In Uterus deutliche Fluktuation. Kindliche Teile nicht palpabel, Herztöne nicht zu hören. Blase steht.
3.	671 1895/96	Fr. O. D.	23 J.	I	Eltern an Phthise gestorben. Kreißende will immer gesund gewesen sein. Erste Menses mit 17 Jahren, letzte Ende November 1894. Diese waren stets regelmäßig. In letzter Zeit häufiges Fieber.	Fundus uteri den Nabel nur wenig überragend. Dasselbst deutliche Fluktuation. Besteht Mitralsuffizienz. Kindliche Herztöne nicht zu hören.
4.	4 1895/96	Fr. M. H.	27 J.	I	Hereditär = 0. War angeblich immer gesund. Erste Menses mit 22 Jahren, letzte Ende Juni 1895. Periode verlief stets o. Bes. — Die erst. Kindsbewegungen wurden im Jan. 1896 gefühlt. Seit Mitte Febr. trat plötzl. Schwell. des Gesichts, der Beine, der Labien auf. Seit Febr. werden keine Kindsbewegungen mehr gefühlt.	Anasarka am ganzen Körper. Abdomen vorgewölbt, stark gespannt. Fundus uteri reicht bis zum Epigastrium. In Uterus Fluktuation. Kindliche Teile nicht palpabel. Herztöne nicht zu hören. Im Urin 7% Albumen, hyal. u. gran. Zylinder.

Fälle.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Nephritis Schädel- lage.	Wehenbeginn am 16. IV. Einige Std. später spontaner Blasensprung. Wegen Wehen- schwäche forceps am 19. IV. Frucht- wassermenge be- trägt 5 Liter.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, Gew. 4260 g, Länge 55 cm.	---
Hydramnion Fußlage.	Wehenbeginn am 3. XI. Wegen nicht Fortschreitens der Geburt künstlich. Blasensprengen. Hierauf bald Spon- tangeburt. Frucht- wasser beträgt 3 Liter.	Plazenta ist dick, Nabel- schnur 56 cm lang, mit vela- mentarer Insertion. Sonst o. Bes.	Normal.	Früh- geborenes Mädchen, stirbt einige Minut. nach der Geburt, Gew. 2430 g, Länge 45 cm.	Kind zeigt starken Aszites und schlechte Entwicklung der Extremitäten.
Hydramnion Vitium Cordis Abortus in Fußlage (Mens. 5—6).	Wehenbeginn am 21. III. Spontaner Blasensprung 12 Stunden später. Wegen Wehen- schwäche Extrak- tion am Fuße. Fruchtwasser- menge beträgt 3 Liter.	Expression der Nachgeburt, hierauf geringe Nach- blutung. Sonst o. Bes.	In erster Zeit leichte Tempe- ratur- steige- rungen, später normal.	Männlicher Fötus, tot, Gew. mit Plazenta 600 g, Länge 29½ cm.	—
Hydramnion Nephritis [Schädel- lage.	Wehenbeginn am 5. IV. Spontaner Blasensprung am 6. IV. Perforation des toten Kindes. Fruchtwasser war sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Leichte Tempe- ratur- steige- rungen.	Totes Mädchen, Gew. 2020 g, Länge 47 cm.	---

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
5.	612 1895/96	Fr. S. Q.	?	?	Hereditär = 0. Kreißende war angeblich immer gesund. Letzte Menses unbekannt.	Anzeichen von L. Deutliche Fluktuation im Bereich des Uteri. Blase stehend.
6.	246 1896/97	Fr. L. M.	?	?	?	?
7.	328 1896/97	Fr. A. B.	38 J.	VIII	Hereditär = 0. Will nie besonders krank gewesen sein. Frühere Geburten waren normal. Letzte Menses Mitte Februar. Erste Kindsbewegungen Ende Juli. Seit dem VI. Graviditätsmonat fiel der Kreißenden der sehr dicke Leib, die Schwellung der Beine auf. Außerdem bestanden sehr empfindliche Rückenschmerzen.	Mittelgroße magere Frau. Leibesumfang in Nabelhöhe 119 cm. Ödem der Beine, Vulva und Bauchhaut. Im Bereich des Uteri deutliche Fluktuation. Kindliche Herztöne hören, Kindsteile palpabel. Blase stehend.
8.	105 1898/99	Fr. Ch. G.	46 J.	III	Hereditär = 0. Als Kind machte Kreißende die engl. Krankheit durch, sonst war sie angebl. immer gesund. Die beid. früher. Geb. waren künstl. Frühgeburten. 1. Periode unbek. Menses waren stets regelmäÙ. Letzte Regel Mitte Sept. 1897. Die erst. Kindsbeweg. wurd. Ende Jan. 1898 geföhlt.	Kleine Frau. Abdomen ist stark aufgetrieben. Varicen, Ödem der Beine. Kindliche Teile palpabel, Herztöne sind zu hören. Fundus Uteri reicht zu Rippenbogen, daselbst ist Fluktuation vorhanden. Blase stehend. Im Urin ist Albumen vorhanden.
9.	452 1898/99	Fr. A. F.	27 J.	VI	Hereditär = 0. Kreißende w. angebl. immer gesund. Erste Periode trat m. 16 Jahr. auf, die Regel verlief stets o. Bes. Frühere 5 Geb. waren normal. Letzte Menses Mitte Juni 1898. Kindsbeweg. wurden nicht geföhlt. Seit 6 Wochen sehr rasche, schmerzhaft. Vergrößerung des Leibes.	Anasarca der Beine und des Bauches. Abdomen sehr aufgetrieben. Leibesumfang in Nabelhöhe 118 cm. Fundus Uteri fast zu proc. xiph. reichen. In Utero deutliche Fluktuation. Kindsteile nicht palpabel. Blase steht.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Lues Schädel- lage.	Nach Punktion der Blase erfolgt spontane Geburt. Es fließt viel Fruchtwasser ab.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Kind, Gew. 1650 g, Länge 43 cm.	—
Hydramnion Schädel- lage Nabel- schnur- vorfall.	Nach Reposition der Nabelschnur erfolgt Spontangeburt. Fruchtwassermenge ist sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Bis zum 9. Tage fieberfrei, dann leichtes kurz- dauerndes Fieber.	Lebendes Mädchen, Gew. 3540 g.	—
Hydramnion Fußlage	Wehenbeginn am 8. X. vormittags. Wegen Wehenschwäche wird Blase gesprengt. Am 8. X. nachts wird Geburt durch Extraktion an den Füßen beendet, die wegen Aszites der Frucht schwierig ist. Es fließt viel Fruchtwasser ab.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, das nach einigen Mi- nuten stirbt, Gew. 3790 g, Länge 48 cm.	Sektionsbef.: Ödema univer- sale, Aszites. (Leibesumfang 40 cm.) Atelek- tase pulmonum, hypoplasia pul- monis praec. dextri. Hypo- plasia lobi dextri hepatis, hyperplasia sinistri. Hyperaemia piae matris, Hämorrhagiae Mediastini.
Hydramnion I. Querlage Enges Becken.	Äußere Wendung auf den Fuß, künstliche Wehenerreg. mittels Hystereuryse am 25. V. Künstliche Blasen-sprengung am 26. V., 6 Stunden später wird Geburt durch Extraktion am Fuß beendet. Fruchtwassermenge be- trägt 4 Liter.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe, Gew. 2670 g, Länge 48 cm.	—
Hydramnion akutum. Bigemini (Mens. VI) Steißlage bei beiden.	Nach künstlichem Sprengen d. Blase, wobei 11 L. Fruchtwasser abfließen, sinkt Leibesumfang auf 97 cm. Am darauffolgenden Tage Spontangeburt einer lebenden und einer toten Frucht.	Spontan. Eine Nabel- schnur inseriert zentral, die zweite marginal. Sonsto. Bes.	Normal.	2 Knaben, I. 31 cm lang, stirbt nach 10 Minuten, II. tot- geboren, 28 cm lang.	eineiige Zwillinge.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
10.	91 1899/1900	Fr. A. L.	38 J.	I	Hereditär = 0. Will immer gesund gewesen sein. Erste Regel mit 17 Jahren. Letzte Regel Ende September. Die Gravidität klagt über starke Spannung des Leibes und Schwellung der Beine.	Ödem der Beine d. Bauchhaut. Leichte Kyphoskoliose. Blasses Aussehen. Leib stark gespannt. Sein Umfang betrug 109 cm. In Utero deutliche Fluktuation. Kindsteile, Herztöne undeutlich wahrnehmbar. Blase steht.
11.	539 1899/1900	Fr. M. S.	23 J.	II	Hereditär = 0. Will immer gesund gewesen sein. Erste Geburt verlief normal. Letzte Regel Anfang April 1899.	Abdomen stark aufgetrieben. In Utero deutliche Fluktuation. Kindsteile undeutlich palpabel, Herztöne sind zu hören. Blase steht. Kreißende fieberhaft.
12.	563 1899/1900	Fr. M. M.	25 J.	III	Hereditär = 0. Will stets gesund gewesen sein. Erste Periode mit 17 Jahren, die dann immer regelmäßig eintrat. Letzte Menses Mitte Juni. Die erste Geburt verlief normal, die zweite war ein Abort im VI. Monat. Der Leib soll vom Ende November in 2—3 Wochen sehr zugenommen haben. Kindsbewegungen wurden niemals gefühlt.	Leib sehr aufgetrieben. Fundus Uteri reicht zum proc. xiph. Palpabel ist nur der obere Teil des Beckens befürchtete Kopf. Kindliche Herztöne sind nicht zu hören. Muttermunde talergroß. Blase steht.
13.	100 1900/01	Fr. H. O.	38 J.	IX	Hereditär = 0. Früher hat Gravidität Scharlach und Unterleibstypus durchgemacht. Erste Periode ist unbekannt. Bis auf die beiden letzten Geburten, wo die Kinder totgeboren wurden, verliefen die anderen normal. Lues wird negiert.	Abdomen stark vorgewölbt u. gespannt. Anasarka der Beine und des Bauches. Uterus reicht bis zum proc. xiph. Kindsteile nicht palpabel. Herztöne fehlen. Muttermund eröffnet. Blase steht.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Schädel- lage.	Wehenbeginn am 14. V. abends. Blase wird ge- sprengt am 15. V. früh. Besserung der Wehen. 15. V. nachts Spontan- geburt. Frucht- wasser sehr reich- lich.	Spontan, o. Bes.	Leichtes Fieber in den ersten Tagen.	Toter Knabe.	Mißbildung, Hemicephal mit starkem Exophthalmus und Struma
Hydramnion Schädel- lage Pneumonie	Beim spontanen Blasensprung fließt viel Frucht- wasser ab. Partus wird spontan be- endet.	Spontan, o. Bes.	Fieber bis zum 11. Tage, dann fieberfrei.	Lebendes Mädchen. Gew. 3150 g.	—
Hydramnion akutum. Abortus (Mens. VI)	Wehenbeginn am 26. I. nachmittags. Beim spontanen Blasensprung fließt viel schmutzig- braunes Frucht- wasser ab. 27. I. Spontangeburt einer toten Frucht.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen. Gew. 950 g, Länge: 30 cm.	Mißbildung. Haut ödematös. Der rechte Arm wird durch eine Art Schwimm- haut im Ell- bogengelenk flektiert gehalt. Ähnliche Haut- falte adduciert den rechten Oberarm. Rechts besteht pes varus, links pes valgus. Der Gaumen ist ge- spalten.
Hydramnion tote Frucht Atonische Nach- blutung.	Wehenbeginn am 3. VI. Blase wird nach 12 Stunden gesprengt, es fließen 3 Liter schmutzig-, braun. Flüssigkeit ab. Nach 1 Stunde er- folgt Spontangeb. in I. Schädellage.	Spontan. Die Cotyle- donen haben schwammig. Aussehen, sonst o. Bes.	Normal.	Toter, macerierter Knabe.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
14.	348 1900/01	Fr. B.	36 J.	XIII	Frau will immer gesund gewesen sein. Hereditär = 0. Erste Menses mit 15 Jahren, waren stets regelmäÙ. Die früheren Geburten waren normal. Letzte Menses Anfang April. Seit Juli wird d. Leib sehr stark, so daß die Gravida seitdem arbeitsunfähig ist.	Abdomen ist stark ausgetrieben. Leibesumfang betr. 127 cm. Im Bereich d. Uterus deutliche Fluktuation. Lungen sind stark nach oben gedrängt. Herz nach links verdrängt. Kindsteile nicht palpabel, kindliche Herztöne dageg. z. h. Portio ist erhalten. Blase steht.
15.	119 1902/03	Fr. S. P.	33 J.	V	Hereditär = 0. Außer einer Masernerkrankung war sie angebl. immer gesund. Die erst. 3 Geburten verlief. normal, die 4. war ein Abort im 2. Monat. Erste Regel mit 14 Jahren, letzte Ende Oktober. Erste Kindsbewegung werden Ende Februar geföhlt. Jetzt klagt Gravida über häufiges Erbrechen, Atemnot, Schwellung d. Beine. Kindsbeweg. hat sie seit Anfang Juni nicht mehr geföhlt.	Kleine, mäßig-kraftige Frau. Varicen, Ödem der Beine. Bauchharte, ödematös. Abdomen groß, stark gespannt. Umfang des Leibes 99 cm. Fundus uteri reicht zum proc. xiphoideus. Fluktuation deutlich. Kindsteile, Herztöne nicht nachweisbar. Blase steht. Muttermund unvollständig eröffnet. Im Urin Albumen, Zylinder vorhanden.
16.	234 1902/03	Fr. E. M.	37 J.	I	Hereditär = 0. War nur als Kind an Diphtherie krank. Erste Periode trat erst mit 19 Jahren auf, trat von da ab regelmäßig auf. Letzte Regel Anfang Januar. In letzten 5 Wochen ist der Leib sehr rasch groß geworden.	Gravida ist klein, schlecht genährt. Der Leib ist sehr groß, stark gespannt. Im Bereich des Uterus deutliche Fluktuation vorhanden bis zum proc. xiphoideus. Herztöne, Kindsteile nicht wahrnehmbar. Blase steht.
17.	245 1902/03	Fr. G. B.	27 J.	V	Mutter ist an Phthise gestorben. Gravida hat nur Masern durchgemacht. Erste Regel mit 17 Jahr., trat dann immer zur richtigen Zeit auf. Letzte Regel Mitte Febr. Gravida hat 2 lebende u. 2 tote ausgetragene Kinder geboren.	Schwächliche, anämische Frau. Leib ausgetrieben. Im Bereich d. Uterus Fluktuation. Kleine Teile nicht palpabel. Kindliche Herztöne nicht zu hören. Blase steht, Cervikalkanal für 2 Finger durchgängig.

Diagnose	G e b u r t	Nachgeburt	Wochen- bett	K i n d	Bemerkungen
Hydramnion bigemini II. Steiß- lage I. Schädel- lage. Atonische Nach- blutung Blutverlust etwa 2 1/3 Lit.)	Blasensprung er- folgt spontan, es fließt ungeheuer viel Fruchtwasser ab. 4 Std. später w. eine tote Frucht geb. Bald darauf eine zweite tote Frucht, bei der nur spärliches Frucht- wasser abfließt.	Manuelle Plazentar- lösung. I. Nabelschn. 49 cm. II. Nabel- schnur 33 cm lang. Eihäute o. Bes.	11 Tage bestand Fieber. Die Rück- bildung des Uterus erfolgt auf- fallend langsam.	2 tote Mädchen. I. poly- hydramnio- tisch, Gew. 1030 g, Länge 35 cm. II. olig- hydramnio- tisch, Gew. 795 g.	Eineiige Zwillinge. Sektionsbefund: I) etwas Aszites. starke Herzhyper- trophie, verun- staltete kleine Leber, harte, kleine Milz, sehr große Nieren, prallgefüllte zum Nabel reichende Blase. II) Normal.
Hydramnion Schädel- lage Nephritis.	Wehenbeginn am 10. VI. Kurz darauf erfolgt spontaner Blasensprung, wo- bei sehr viel braun- gefärbtes Wasser abfließt. Nach 13 Stunden erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter macerierter Knabe, Gew. 3240 g, Länge 48 cm.	—
Hydramnion I. Gesichts- lage.	Wehenbeginn am 12. III. Nächsten Tag spontaner Blasensprung mit Abfluß sehr großer Fruchtwasser- menge. Unmittel- bar darauf Spon- tangeburt in Ge- sichtslage.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen, Gew. 780 g, Länge 46 cm.	Mißbildung. Hinterkopf und Rücken breit u. fest verwachs., wodurch Ge- sichtslage erkl. ist. Rechts am Hinterkopf eine von Kopfhaut umgeb., apfel- große fluktuier. Geschwulst, die Hirnsubst. enth.
Hydramnion I. Vorder- haupts-lage.	Wehenbeginn am 17. VIII. Nach 12 Stunden spontaner Blasen- sprung, viel Fruchtwasser. Kurz darauf Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe, maceriert, Gew. 1700 g, Länge 35 cm	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
18.	311 1903/04	Fr. M. S.	19 J.	I	Hereditär = 0. Früher wegen Anämie, 1902 weg. Magengeschwür behandelt. Erste Regel mit 13 Jahren, normal. Letzte Regel Mitte November 1902. Erste Kindsbewegungen April gefühlt. In letzt. Zeit häufig Kopfschm. und Erbrechen.	Stark anämische Frau. Anasarka d. Beine des Bauches. Leibumfang 109 cm. Deutliche Fluktuation. Kindsteile undeutlich. ebenso Herztöne. Muttermund zweimarkstückgroß. Blase steht.
19.	527 1903/04	Fr. A. K.	26 J.	III	Will stets gesund gewesen sein. Hereditär = 0. Erste Regel mit 17 Jahren, war dann häufig unregelmäßig. Letzte Regel Ende März. Die beiden früheren Geburten war. normal. Das zweite Kind starb 3 Monate nach der Geburt.	Magere, blasse Frau. Abdomen stark, gleichmäßig vorgewölbt. Uterus, in dessen Bereich Fluktuation nachweisbar, reicht fast zum proc. xiph. Kindsteile palpabel. Kindl. Herztöne sind zu hören. Blase prall gefüllt, steht. Muttermund fünfmarkstückgroß.
20.	664 1903/04	Fr. M. H.	20 J.	I	Hereditär = 0. Früher hat Gravidita nur Scharlach durchgemacht. Erste Menses mit 14 Jahren, dann immer regelmäßig. Letzte Periode Mitte April. Gravidita ist völlig frei von Beschwerden.	Kreisende ist kräftig. Ödeme fehlen. Abdomen ungewöhnlich stark vergrößert. Fundus Uteri einen Querfinger unterhalb des proc. xiph. Im Fundus ist der Kopf palpabel. Kindliche Herztöne sind deutlich zu hören. Muttermund für 1 Finger durchgängig, Blase steht prall gefüllt.
21.	17 1904/05	Fr. O. K.	35 J.	VIII	Unbekannt. Am 28. III. 1904 aufgenommen.	Unbekannt.
22.	63 1904/05	Fr. E. P.	34 J.	X	Unbekannt. Am 19. IV. 1904 aufgenommen.	Unbekannt.
23.	704 1904/05	Fr. R. K.	31 J.	IV	Unbekannt. Am 12. II. 1905 aufgenommen.	Unbekannt.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
dramnion Schädel- lage.	Wehenbeginn am 20. VIII. Blasen- sprung spontan nach 18 Stunden, Fruchtwasser sehr reichlich, mekoniumhaltig. Spontangeburt 2 Stunden nach dem Blasensprung.	Spontan, o. Bes.	durch Mastitis kom- pliziert, sonst o. Bes.	Lebender Knabe, Gew. 3420 g, Länge 53 cm.	—
dramnion Schädel- lage.	Wehenbeginn am 14. XII. Blasen- sprung spontan nach 12 Stunden, es fließen 3 Liter Fruchtwasser ab. Geburt erfolgt spontan 12 Stunden nach dem Blasen- sprung.	Spontan. Plazenta weist auf mütterlicher Seite zahl- reiche weiße Infarkte auf. Nabelschnur 42 cm. Eihäute o. Bes.	Normal	Lebender Knabe, Gew. 3140 g, Länge 50 cm	—
dramnion I. Steiß- lage.	Wehenbeginn am 12. II. Nach 6 Stunden erfolgt spontaner Blasensprung. Es fließt viel mekoniumhaltigen Fruchtwassers ab. Geburt wird 10 St. nach dem Blasen- sprung durch Ex- traktion an den Füßen beendet.	Plazenta wird 5 Minuten post partum weg. Blutung nach Credé exprimiert, ist ebenso wie Nabel- schnur und Eihäute o. Bes.	Durch Zystitis und riechend. Lochial- sekret kom- pliziert	Lebendes Mädchen, Gew. 3800 g, Länge 55 cm.	—
dramnion igemini.	Erfolgte am 12. IV. 1904.	Manuelle Lösung der Plazenta, Curette.	Exitus let. am 12. IV. 1904.	Zwei tote Mädchen, I. Gew. 610 g, II. Gew. 330 g.	—
dramnion igemini (Abort. sens. VI.)	Erfolgte am 21. IV. 1904.	Manuelle Plazentar- lösung.	Durch beider- seitige Mastitis kom- pliziert.	Zwei tote Knaben, I. Gew. 550 g, II. Gew. 350 g.	—
dramnion hädellage Sepsis.	Erfolgte am 12. II. durch Wendung und Extraktion.	Mit Hilfe von Credé geboren.	Exitus let. am 12. II. 1905.	Lebender Knabe, stirbt nach 2 Wochen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
24.	221 1905/06	Fr. Cl. S.	31 J.	VI	Vater und Mutter an Phthise gestorben. Erste Regel mit 14 J. Periode war dann stets unregelmäßig, blutverlustreich, von 8—10 tägiger Dauer. Bis zur fünften Entbindung will sie gesund gewesen sein. 4 Wochen vor dieser erwähnten Entbindung wurde Nierenentzünd. diagnostiziert. Wegen Hydramnion wurde dann künstl. Frühgeburt mit 6½ Mon. eingeleit. Fötus war bereits verwest. Letzte Regel Anf. Dezember. Seit Juni 1905 Schwell. des Leibes, der Beine, Atemnot.	Mittelgroße Frau. Ödem der Beine, d. Vulva. Linke Herzgrenze verbreit. Über Aorta und Mitral. systol. Geräusch. Abdomen trotz Blasesprunges stark gespannt. Kindste nicht palpabel. Kindliche Herztöne undeutlich. Muttermutter eröffnet. Im Urin Albumen in geringe Menge vorhanden.
25.	302 1905/06	Fr. M. F.	39 J.	IV	Hereditär=0. Gravida hat Masern, Scharlach, Windpock., gastrisch. Fieber durchgemacht. Erste Menses mit 16 J., von da ab stets regelmäßig. Frühere Geburten verlief. normal. Letzte Menses Mitte November. Ende März werden erste Kindsbewegungen gefühlt. Seit 2 Monaten sind Leib und Beine auffallend dick geworden.	Ödem der Beine u. Bauchhaut. Leibumfang beträgt in Nabelhöhe 107½ cm. Im Urin findet sich kein Albumen.
26.	432 1905/06	Fr. P. S.	41 J.	IX	Vater an Phthise gestorben. Gravida hat nur die Masern durchgemacht. Die ersten 7 Geburten verliefen normal. Der 8. partus war Abort im III. Mon. Letzte Regel Anfang März, die erst. Kindsbewegungen Mitte Juli. Gravida klagt über Erbrechen und Schwellung d. Beine.	Große, kräftige Frau. Anasarka des ganzen Körpers. Abdomen stark aufgetrieben. Fundus Uteri reicht bis Handbreit unter den proc. xiph. Äußere Orientierung über Frucht unmöglich. Blase steht, ist prall gefüllt.
27.	441 1905/06	Fr. A. G.	24 J.	IV	Unbekannt. Am 20. X. 1905 aufgenommen.	Unbekannt.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Vitium Cordis Schädel- lage.	Wehenbeginn am 5. VII. abends. Blasensprung er- folgt spontan am 6. VII. früh. Hier- bei soll sehr viel Fruchtwasser ab- geflossen sein. 13 Stunden nach dem Blasensprung erfolgt Spontan- geburt.	Spontan. Plazenta ist sehr zer- klüftet und stark öde- matisch, wiegt 1550 g. Nabel- schnur, Eihäute o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe mit Aszites und Anasarka. Gew. 2580 g, Länge 42 cm. Stirbt nach einigen Minuten.	Hier ist Hydramnion zum II. Male aufgetreten.
Hydramnion Schädel- lage.	Wehenbeginn am 12. VIII. Nach 10 Stunden erfolgt spontaner Blasen- sprung. Es fließen 4 Lit. Fruchtwass. ab. 3 Stund. später erfolgt Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, Gew. 3180 g, Länge 50 cm.	—
Hydramnion bigemini Stirnlage I. Vorder- hauptslage.	Wehenbeginn am 21. X. Es erfolgt spontaner Sprung beider Blasen nach 1 resp. 1 $\frac{3}{4}$ Stund. Beide Male fließt viel Fruchtwasser ab. Bald nach jedem Blasen- sprung find. spon- tane Geburt beider Früchte statt.	Spontan, o. Bes. Hierauf atonische Nach- blutung.	Normal.	2 lebende Mädchen. I. Gewicht 2100 g, Länge 44 cm, II. Gewicht 2150 g, Länge 45 cm. II. Mädchen stirbt noch denselb. Tag. I. Mädchen nach 24 Std.	Einzelige Zwillinge. beide polyhydram- niotisch. Sektionsbefund: I. Anasarka, beider- seitiger Pleura- erguß, Hydro- perikard, Hyper- trophie des I. Ven- trikels, Hyperämie von Leber, Milz. II. Starke Hyper- ämie von Lunge, Leber, Milz. Eckchymosen an Pleura und Perikard.
Hydramnion acutum gemini (Ab- ort Mens. V).	Spontangeburt am 24. X.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Zwei tote Knaben.	Eineiige Zwillinge.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
28.	684 1905/06	Frl. M. S.	18 J.	I	Hereditär = 0. Kreißende will nie erheblich krank gewesen. Erste Regel mit 14 Jahren, war dann stets normal. Letzte Regel Anfang April. Die ersten Kindsbewegungen merkte sie im Juli. Seit Ende Dezember Atemnot, starke Zunahme des Leibes.	Leib stark gespannt. Umfang 112 cm. Kindsteile palpabel. Kindliche Herztöne sind zu hören. Cervix fast verstrich. Kopf vorliegend. Blase steht.
29.	628 1906/07	Fr. H. W.	24 J.	II	Hereditär = 0. Kreißende war nur an Masern erkrankt. Erste Menses mit 13 Jahren, d. sich dann regelmäßig wiederholte. Die erste Geburt verlief normal. Im Anschl. daran trat heftige Blutung auf. Das Wochenbett verlief fieberhaft. Letzte Reg. war den 5. IV. 1906. Erste Kindsbewegung wurden Ende August gefühlt.	Mittelgroße gut genährte Frau. Abdomen stark aufgetrieben. Sein Umfang betr. 122 cm. Fundus etwas unterhalb des proc. xiphoidei. Kindsteile deutl. palpabel, Herztöne deutlich zu hören. Cervix verstrichen. Muttermund handtellergrößer. Blase steht. Kopf liegt vor.
30.	201 1907/08	Fr. E. K.	31 J.	VIII	Unbekannt. Aufnahme am 9. II. 1908.	Unbekannt.
31.	459 1908/09	Fr. E. A.	24 J.	I	Vater an Magenkrebs, Mutt. an Wassersucht gestorbt. Gravida hat nur Rhachitis durchgemacht. Erste Regel mit 14 Jahren, blieb regelmäßig. Letzte Menses Anf. Februar. Morgens besteht häufiges Erbrechen. Am 30. IX. Abgang von Blut und Wasser. Lues wird negiert.	Mittelgroße Frau. Fundus Uteri reicht bis z. Rippenbogen. Im Bereich d. Uterus deutliche Fluktuation. Kindsteile nicht palpabel, Herztöne nicht z. hör. Blase springt bei der Untersuchung. es fließt viel Fruchtwasser ab. Kopf vorliegend, beweglich.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion [Schädel- lage.	Wehenbeginn am 11. II. mittags. Spontaner Blasen- sprung am 12. II. 4 Uhr morgens, wobei viel Frucht- wasser abfließt. Nach 5 weiteren Stunden erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	feieberhaft infolge von Angina und Ulcera Vaginae.	Lebendes Mädchen. Gew. 3540 g, Länge 51 cm.	—
Hydramnion [bigemini [Schädellage Atonische Nach- blutung.	Wehenbeginn am 4. I. Bald darauf spontaner Sprung der I. Blase, nach 6 Stund. Spontan- geburt des einen Zwilling. Nach 1½ Stunden. II. spontaner Blasensprung, wo- bei viel Frucht- wasser abfließt, gleich darauf Spontangeburt des zweiten Zwilling.	Nachgeburt wird nach Credé exprimiert. Die dem II. Zwilling gehörende Plazenta ist größer, ihre Nabel- schnur ödematös.	Normal	2 lebende Knaben. I. Gewicht 2890 g, II. Gewicht 3240 g, Länge 52 cm.	Zweieiige Zwillinge mit einseitiger Polyhydramnie.
Hydramnion [Schädel- lage.	Erfolgt am 12. II. Spontan.	Spontan, o. Bes.	feieber- haft wegen einer Ent- zündung am linken labium mai.	Lebendes Mädchen, Gew. 2800 g.	—
Hydramnion [Schädel- lage.	Wehenbeginn am 2. X. 3 St. später war Blasensprung erfolgt, nach wei- teren 7 Stunden erfolgt Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe, mazeriert. Gew. 2950 g, Länge 38 cm.	Aszites der Frucht. Verdacht auf Lues.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	N a m e	Alter	? para	A n a m n e s e	S t a t u s
32.	701 1908/09	Fr. A. M.	39 J.	III	Hereditär=0. Gravida hat Rhachitis, Lungen- u. Herzkrankh. durchgemacht. Die beiden früh. Geburten waren Zangengeburt. Erste Periode unbekannt, letzte am 27. April. In letzter Zeit bestehen empfindl. Schmerzen im Leib.	Kleine, blasse Frau mit Zeichen früherer Rhachitis. Ödem d. Beine. Leib relativ stark. Umf. betr. 96 cm. Im Bereich des Uterus Fluktuat. nachweisbar. Ders. reicht fast zu Rippenbog. Kindsteile nicht palp., Herztöne undeutl. Blase steht. Cervix nicht verstrickt.
33	868 1908/09	Fr. M. K.	33 J.	I	Mutter an Wassersucht, Vater a. Lungenkrankheit gestorben. Gravida hat Diphtherie und Bleichsucht durchgemacht. Erste Menses mit 17 Jahren, die später unregelmäßig auftrat. Letzte Menses Mitte Juni. Die gegenwärt. Gravidität verlief beschwerdefrei.	Mittelgroße Frau. Innere Organe gesund. Leibesumfang 106 cm. Uterus, in dessen Bereich Fluktuat. nachweisbar ist, reicht 13 Querfingerweit unterhalb des proc. xiph. Kindsteile sind palpabel, ebenso sind Herztöne zu hören. Cervix erhalten, Wehen schlecht.
34	276 1909/10	Fr. K. W.	20 J.	I	Hereditär = 0. Gravida will stets gesund gewesen sein. Letzte Regel am 25. XI. 09. Kindsbewegungen verspürt sie seit März.	Mittelgroße, kräft. Frau. Ödem der Beine. Fundus Uteri reicht nicht ganz zum proc. xiph. Kindsteile, kindliche Herztöne gut wahrnehmbar. Muttermund f. 1 Finger durchgängig, Kopf vorliegend. Blase steht.
35	708 1909/10	Fr. P. S.	36 J.	XI	Hereditär = 0. Kreiß. war angeblich immer gesund. Erste Menses trat mit 19 Jahren auf, kam regelmäÙ. wieder. Frühere partus waren norm., bis auf 2 Aborte im 2.-3. Mon. während der 6. u. 7. Schwangerschaft. Letzte Periode waren 28. Juli. Erste Kindsbewegungen werden Ende Novemb. geföhlt. Seit dieser Zeit schnelles Wachstum des Leibes. Gegenwärtig besteht Atemnot und starke Spannung im Leibe.	Kleine Frau, mittelkräftig. Anasarka d. Beine, des Bauches. Über beiden Lungen bronchit. Geräusch Abd. stark gespannt. Leibesumfang betr. 107 cm. Fundus reicht bis zum proc. xiph. Kindsteile und kindliche Herztöne nicht wahrnehmbar. Cervix nicht vollständig entfaltet. Muttermund f. 1 Finger durchgängig. Blase steht. Kopf liegt vor-

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion I. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 24. I. vorm. Wegen Wehenschwäche wird Blase gesprengt, wobei viel Fruchtwasser abfließt. Nach 2 St. erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen. Gew. 3780 g, Länge 52 cm.	—
Hydramnion I. hintere Hinter- hauptslage drohende Uterus- ruptur.	Wehenbeginn am 23. III. Vorm. Beim spontanen Blasensprung entleeren sich 3 Liter Fruchtwasser. Wegen Gefährdung der Blase und Hochstandes des Kontraktionsringes wird am 27. III. nachmitt. forceps angelegt.	Wird nach Crédé ex- primiert, ist o. Bes.	3 Std. nach der Ent- bindung erfolgt der Exitus let.	Lebender Knabe. Gew. 3500 g, Länge 56 cm, stirbt 3 Tage nach der Geburt.	Sektionsbefund der Mutter: Struma; links- seitige, torqu., kindskopfgröße Parovarial- zyste.
Hydramnion I. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 21. VII.; 1½ Std. später künstlicher Blasensprung, wobei sich 4 Liter Flüssigkeit entleeren. Nach 1 Std. wird asphyktisch. Kind spontan geboren.	Wegen Blutung wird Placenta nach Créde exprimert. Diese, wie Nabelschnur und Eihäute o. Bes.	Normal.	Lebendes, stark as- phyktisches Mädchen, stirbt bald darauf. Gew. 3200 g, Länge 49 cm.	—
Hydramnion bigemini Partus prae- matur. (sens. VI-VII) Bronchitis diffusa.	Wehenbeginn am 27. XII. Spontaner Blasensprung nach 7 Std., wobei 7 Liter Fruchtwasser abfließen. Bald darauf Spontangeburt der beiden Zwillinge. Beim zweiten Zwilling fließt nur wenig Fruchtwass. ab.	Spontan, o. Bes.	Febril wegen riechend. Lochien.	2 Mädchen. I. stirbt nach ½ Stunde, Länge 32 cm. II. Totgeburt, Länge 30 cm.	Eineiige Zwillinge mit Poly- u. Oligo- hydramnie.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
36	804 1909/10	Fr. E. M.	30 J.	IV	Hereditär = 0. Mit 17 Jahren wurde bei der Kreißenden ein Leibschnittweg einer Geschwulst im Leibe gemacht. Erste Menses unbekannt, kehrte immer regelm. wieder. Die 3 früh. Geburten waren normal. Letzte Menses am 2. V. 1909.	Mittelgroße, kräftige Frau. Herz, Lunge o. Bes. Abdomen gleichmäßig stark angetrieben. Uterus, dessen Bereich Fluktuation nachweisbar ist, reicht bis z. Rippenbogen. Kindsteile palpab., Herztöne sind zu hören. Cervix nicht verstrichen, Blase stark Promontorium gut erreichbar.
37	34 1910/11	Fr. B. K.	27 J.	VII	Hereditär = 0. Gravida will nur d. Masern gehabt haben. 1. Periode mit 16 Jahren, von da ab regelmäßig Menses. Frühere Geburten verliefen alle normal. Letzte Regel Ende August 09. Die ersten Kindsbeweg. wurden Mitte Januar gefühlt. Seit dies. Zeit starke Schwellung der Beine, des Leibes, Atemnot.	Mittelgroße, gut genährte Frau. Vari. u. Anasarka der Beine u. Ödem der Bauchhaut. Brusthöhlenorgane o. Bes. Leib stark angetrieben u. gespannt. Fluktuation ist nachweisbar. Fundus reicht zum Rippenbogen. Kindsteile, Herztöne nicht wahrnehmbar. Cervix verstrichen. Muttermund fünfmarkstückgroß. Blase steht, Kopf liegt vor. Im Urin finden sich Spuren von Eiweiß.
38	775 1910/11	Fr. O. Chr.	28 J.	II	Hereditär = 0. Kreiß. hat Masern, Diphth., Gelenkrheumatismus mit gleichzeitig. Herzkrankung durchgemacht. Erste Periode erfolgte mit 16 Jahren, trat dann regelmäßig auf. Vor 2 Jahren erfolgte eine Totgeburt im 7. Schwangerschaftsmonat. Letzte Regel den 10. III. 10. Im Anfange der jetzigen Gravidität bestand häufig Erbrechen und Schwindelgefühl.	Große, kräftige Frau. Anasarka der beiderseitigen Malleolarregion. Über der N. tralis systolisches Geräusch, Verstärkung des 2. Fulmonaltones. Uterus reicht fast zu proc. xiphoid. Kindsteile sind gut fühlbar. kindl. Herztöne sind deutlich zu hören. Muttermund vollständig eröffnet, Blase steht

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
dramnion Schädel- lage Pelvis angusta.	Künstliche Wehen- erzeugung mittels Hystereuryse. Nach 16 Std. wird Blase gesprengt, wobei mehr. Liter Fruchtwasser ab- fließen. Nach wei- teren 12 Std. Be- endigung d. Geburt durch Wendung u. Extraktion.	Plazenta wird nach Credé expri- miert, diese wie Nabel- schnur und Eihäute o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe, Gew. 3100g, Länge 50 $\frac{1}{2}$ cm.	—
dramnion	Wehenbeginn am 13. IV. Blase wird nach 2 $\frac{1}{2}$ Std. ge- sprengt, wobei viel blutig gefärbtes überreichendes Fruchtwasser ab- fließt. Nächstfolg. Tag Spontangeb. einer totfaulen Frucht.	Plazenta muß nach Credé exprimiert werden. Nabelschnur nur 36 cm lang. Geringe atonische Nach- blutung.	Normal.	Toter Knabe, mazeriert, Gew. 3350g, Länge 41 cm.	—
dramnion Schädel- lage Mium Cord. alvulare.	Wehenbeginn am 11. XII., 9 Stunden später erfolgt spontaner Blasen- sprung, wobei sehr viel mekonium- haltiges Fruchtw. abfließt. Nach wei- teren 14 Stunden erfolgt Spontan- geburt einer lebenden Frucht.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, Gew. 3840g, Länge 50 cm.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
39	436 1893/94	Fr. A. L.	32 J.	VI	Hereditär = 0. Kreißende war immer gesund. Die fünf früheren Geburten verliefen normal.	Anasarka der Bauchhaut, der unteren Extremitäten. Der Bauch ist stark aufgetrieben. Im Bereich des Unterbauchs ist Fluktuation vorhanden. Kindsteile deutlich palpabel, Herztöne deutlich. Blase steht. Urin frei von Albumen.
40	475 1893/94	Fr. J. S.	33 J.	II	Hereditär = 0. Gravida war angeblich immer gesund. Der erste Partus verlief normal. Der Kreißend. ist der starke Leibaufgefallen, sowie jegl. Fehlen von Kindsbewegungen seit etwa 5 Wochen.	Unbekannt.
41	560 1893/94	Fr. F. M.	43 J.	XI	Hereditär = 0. Frühere Geburten waren bis auf 2 Aborte normal. Lues wird negiert.	Unbekannt.
42	566 1893/94	Fr. E. St.	21 J.	I	Hereditär = 0. Gravida hat nur Kinderkrankheiten durchgemacht. Periode war stets regelmäßig.	Mittelgroße Frau mit stark aufgetriebenem Leib. Dasselbe ödematöse Fluktuation vorhanden. Von Kindsteilen nur der Kopf palpabel, der i. Becken feststeht. Blase steht. Wehen schlecht.
43	577 1893/94	Fr. A. B.	39 J.	IX	Hereditär = 0. Gravida hat 5 mal abortiert. Unter den 3 normalen Geburten waren einm. Zwillinge vertreten.	Mittelgroße Frau mit Ödem der Beine und Vulva. Leib ist sehr stark aufgetrieben. Kindsteile und Herztonen deuth. wahrnehmbar. Im Urin ist Eiw. in Spuren vorhanden.
44	364 1894/95	Fr. J. P.	21 J.	V	Hereditär = 0. War früher angebl. immer gesund. Menses regelmäßig. Die 1. u. 4. Geburt erfolgte wegen schlechter Lage mit ärztlich. Hilfe. Letzte Regel unbekannt.	Mittelgroße Frau mit sehr starkem Leibumfang (115 cm). Anasarka der Beine, des Bauches. Kindsteile nicht palpabel, Herztöne schwer zu hören. Muttermark fünfmarkstückgroß. Blase steht. Wehen schlecht.

fälle.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Schädel- lage vorliegende Nabel- schnur.	Blasenstich, wo- bei mehrere Liter Fruchtwasser ab- fließen. Hierauf Wendung und Ex- traktion.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe mit Atresia ani u. Phimose. Wird 24 Std. nach Geburt operiert, stirbt kurz darauf.	Sektionsbefund: Striktur beider Uretheren 1 cm unterhalb des Hilus. Über und unter der Strikturstelle fingerdicke Dila- tation. Blase ist sehr groß, prall gef., sonst o. B.
Hydramnion Steißlage.	Die Geburt erfolgte vor dem Eintreffen des Arztes. Fruchtw. war angeblich in sehr großer Menge abgeflossen.	Nachgeburt, nach Credé exprim. Die Nabelschnur so stark ge- wunden, daß die Bauch- haut an der Torsion teilnimmt.	Normal.	Totes Mädchen.	Mißbildung, Anenzephal, Torsion der Nabelschnur.
Hydramnion Schädel- lage.	Beim Blasenspr. fließt viel Fruchtw. ab. Bald darauf Spontangeb. einer mißbild. Frucht.	Wegen Retentio Pla- zentae wird dieselbe nach Credé exprim., sonst o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe, stirbt am nächst- folgenden Tage.	Mißbildungen verschiedener Art.
Hydramnion Schädel- lage.	Auf Blasenstich fließt 3 Lit. Flüssigk ab, hierauf Besse- rung der Wehen, aber nur vorüber- gehend; daher Wendung und Ex- traktion.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe mit Aszites und Struma. Stirbt bald nach der Geburt.	—
Hydramnion Querlage.	Äußere Wendung. Spontaner Blasen- sprung (3 Liter Fruchtwasser) hierauf Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Schädel- lage.	Wegen schlechten Fortschreitens der Geburt erfolgt Blasenstich, wo- bei sehr viel Fruchtw. wasser abfließt. Nach einigen Stunden erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
45.	76 1894/95	Fr. E. J.	41 J.	VII	Hereditär = 0. Gravida ist früher nie wesentlich krank gewesen, menstruierte stets regelmäßig. Bei der 3 Schwangerschaft erfolgte eine Fehlgeburt im V., bei der 4. eine solche im II. Monat. Die übrigen Geburten waren norm. Letzte Menses Mitte Juli 1893. Trotz kräftiger Wehen geht die Geburt nicht weiter.	Leib stark aufgetrieben, Fluktuation ist nachweisbar. Starkes Ödem der Beine. Kindsteilen nur durch Becken feststehen. Kopf palpabel. Kindli. Herztöne sind nicht zu hören. Blase stark ist prall gefüllt.
46.	526 1894/95	Fr. A. B.	27 J.	III	Eltern starben an Lungentuberkulose. Sie selbst war angebl. immer gesund. Mit 17 Jahren erste Menses, die sich dann regelmäßig wiederholte. I. Geburt verlief normal, bei der II. mußte das Kind gewendet werden. Letzte Regel am 23. Mai.	Stark aufgetriebener, gespannter Leib (umfang 101 cm). Im Bereich des Uterus Fluktuation nachweisbar. Von Kindsteilen nur Kopf und Schenkel palpabel. — Kindli. Herztöne werden nicht gehört. Blase stark. Mutterm. handtellergroß, Wehen schlecht.
47.	21 1894/95	Fr. M. K.	21 J.	I	Hereditär = 0. Will immer gesund gewesen sein. Menstruierte stetsregelmäßig. Letzte Menses unbekannt.	Abdomen stark aufgetrieben, mit nachweisbarer Fluktuation. Kindsteile nicht palpabel, Herztöne werden nirgends gehört. Blase steht. Wehen gut.
48.	90 1894/95	Fr. A. M.	42 J.	XI	Hereditär = 0. War angebl. stets gesund. Frühere Entbindung verlief normal. Letzte Periode unbekannt. Gravida klagt jetzt über starke Kreuzschmerzen, Spannung im Leibe, Atemnot, Schwellung d. Beine.	Leib stark, gleichmäßig aufgetrieben, mit nachweisbarer Fluktuation. Ödem der Beine und Vulva. Urin ist albumenhaltig.
49.	129 1894/95	Fr. M. G.	28 J.	I	Unbekannt.	Unbekannt.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Schädel- lage.	Nach dem Blasen- stich, wobei meh- rere Liter Frucht- wasser abfließen, erfolgt Spontan- geburt.	Wegen Re- tention wird Plazenta 2 $\frac{1}{2}$ Stunden post partum nach Credé exprimiert, sonst o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Querlage prso-anter.	Wehenbeginn am 23. II. Versuch der äußeren Wendung am 26. II. mißlingt. Blasenpunkt. am 27. II., Wendung auf den Fuß und Extraktion. Frucht- wasser sehr reichl.	Expression nach Credé, sonst o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Schädel- lage mit Nabel- schnur- vorfall.	Nach spontanem Blasensprung fließt viel Fruchtwass. ab. Kurz darauf Vorfall d. pulsier. Nabel- schnur b. Schädel, daher ohne Repo- sitionsversuch forceps.	Spontan, o. Bes.	Die drei ersten Tage fieber- haft, dann normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Querlage.	Wendung und Ex- traktion. Frucht- wassermenge war sehr bedeutend.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Schädel- lage mit Nabel- schnur- vorfall.	Wendung und Extraktion.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
50.	157 1894/95	Fr. E. H.	29 J.	VI	Unbekannt.	Leib sehr aufgetrieben. Anasarka der Beine. Bereich des Uterus deutliche Fluktuation. Nabel nicht zu hören. Die Vermutung auf Hydrocephalus durch innere Ursache bestätigt.
51.	280 1894/95	Fr. M.	28 J.	I	Unbekannt.	Unbekannt.
52.	369 1894/95	Fr. A. M.	36 J.	VI	Unbekannt.	Unbekannt.
53.	425 1894/95	Fr. M.	33 J.	V	Hereditär = 0. Kreißende war angeblich immer gesund. Vier frühere Geburten verliefen normal. Menstruation war immer regelmäßig, d. letztmal Anfang Mai. Gravida war bis Ende Novemb. beschwerdefrei, von da an starke Kreuzschmerzen, Spannungsgefühl im Leibe.	Leib stark vorgewölbt. Fluktuation ist nachweisbar. Die Kindsteile sind palpabel. Kindl. Herztöne sind nicht zu hören. Bei kindl. Füße liegen bereits außerhalb d. Vulva. Muttermunde saum wulstig. Kind reitet auf pulsloser Nabelschnur. Temperatur beträgt 37,7°.
54.	435 1894/95	Fr. R. F.	32 J.	VII	Hereditär = 0. Kreißende hat 6 normale Geburten durchgemacht. Letzte Menses Anfang April. Von früheren Krankheiten weiß Gravida nichts. Fruchtwasser ist in groß. Menge abgefloss.	Leib ist angeblich sehr weit gewesen. Sein Umfang beträgt nach Abfluß d. Fruchtwasser 100 cm. Ein kindlicher Arm ist in der Vulva sichtbar. Es sind sehr zahlreiche Kindsteile palpabel.
55.	461 1894/95	Fr. H. P.	39 J.	XIII	Hereditär = 0. Früher war sie angeblich nie wesentlich krank. Menstruation war regelmäßig. Von den 12 Geburten verliefen 11 normal. Einmal abortierte sie. Letzte Regel Mitte April.	Mittelgroße Frau. Leib stark vorgewölbt. Sein Umfang beträgt 117 cm. Ödem der Beine, d. Vulva. Kindsteile sind palpabel. Herztöne am deutlichsten über d. Nabel. Muttermunde fünfmarkstückgroß. Blase steht, ist prall gespannt.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Hydrocephalus Fußlage.	Wird durch Perforation und Extraktion beendet. 3—4 Liter Fruchtwasser.	Spontan, bis auf eine sehr lange Nabelschnur, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen.	Mißbildung: Hydrocephalie mit sehr langer Nabelschnur.
Hydramnion I. dorso- anter. Querlage mit Nabelschnurvorfall.	Wendung und Extraktion. Viel Fruchtwasser.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Schiefelage.	Blasenstich, Wendung und Extraktion. Fruchtwassermenge sehr erheblich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe.	—
Hydramnion Fußlage.	Wehenbeginn am 20. XII. Nacheinig. Stunden spontaner Blasensprung, wobei angeblich sehr viel Fruchtwasser abgeflossen ist. Die Geburt wird durch Extraktion und Veit-Smellie beendet.	Nachgeburt wird nach Credé exprimiert, ist o. Bes.	Normal.	Toter Knabe. Länge 45 cm.	—
Hydramnion bigemini. in zweiter dorso-post. Querlage m. Vorfall des r. Armes. I. in erster dorso-anter. Querlage.	Wehenbeginn am 28. XII. Nach 7 Std. spontaner Blasensprung mit Abfluß von viel Fruchtwasser und Armvorfall. Beide Früchte werden auf den Fuß gewendet u. extrah.	Spontan, o. Bes.	Normal.	I. Kind lebend, schwachlich. II. Kind lebend, groß, kräftig.	Zweieiige Zwillinge.
Hydramnion Schädel- lage.	Spontaner Blasensprung, spontane Geburt, dann erst Abfluß einer groß. Menge von Fruchtwasser.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
56.	3 1895/96	Fr. E. S.	31 J.	IX	Hereditär = 0. Will nie besonders krank gewesen sein. Frühere Geburten verliefen normal. Menstruation war regelmäÙ. Letzte Regel unbekannt. Seit 6 Wochen Schwellung der Beine, des Leibes, Atemnot.	Stark vorgewölbt. Leib, sein Umfang trägt 126 cm. Im reich des Uterus Fluktuation. Kindsteile nicht palpabel, Herztöne nirgends zu hören. Muttermund fünfmal stückgroß. Blase steht. Kein vorliegend. T.
57.	187 1895/96	Fr. E. L.	36 J.	II	Hereditär = 0. Gravida war angebl. immer gesund. Der erste Partus war normal. Jetzt hat sie starke Kreuzschmerz.	Leib stark vorgewölbt. Im Bereich des Uterus ist Fluktuation nachweisbar. Kindsteile undeutlich palpabel. Herztöne sind zu hören von normal. Frequenz. Der Muttermund noch geschlossen.
58.	232 1895/96	Fr. E. B.	31 J.	III	Hereditär = 0. War angeblich nie krank, außer Kinderkrankheiten. Menstruation war immer regelmäÙ. Der erste Partus verlief normal, d. zweite Mal abortierte Kreiß. im VII. Graviditätsmonat. Letzte Regel Ende Januar. Lues wird negiert.	Leib ziemlich stark vorgewölbt mit deutl. nachweisb. Fluktuation. Fruchtsehr beweglich. Kindsteile sind palpabel, Herztöne nicht zu hören. Muttermund handtellergroß, Blase steht, ist stark vorgewölbt.
59.	472 1895/96	Fr. A. R.	27 J.	IV	Vater ist an Tuberkulose gest. Der erste Part. war eine Zangenentbdg. Die 2 u. 3. Entbindung verlief norm. Gravida menstruierte regelm. Letzte Regel Mitte Mai. Die ersten Kindsbeweg. fühlt sie seit Mitte September. Jetzt klagt sie über Schwellung d. Beine, zeitweises Schwellen der Lider, Atemnot.	Mittelgroße, gut genährte Frau. Ödem d. der Beine. Abdomen sehr vorgewölbt. Kindsteile sind palpabel. Herztöne sind deutlich zu hören. Der Muttermund ist völlig erweitert, die Blase ist gesprungen. Wehen sind kaum vorhanden.
60.	535 1895/96	Fr. O. K.	33 J.	II	Hereditär = 0. Will stets gesund gewesen sein. Erste Regel mit 16 Jahr., wiederholte sich stets regelmäÙig. Der erste Part. verlief normal. Letzte Regel Anf. Mai. Die ersten Kindsbeweg. werden im Oktober gefühlt.	Schwächl. Frau. Umfang des Abdomen beträgt 107 cm. Kindsteile sind schwer palp. Muttermund ist handtellergroß. Die Blase steht. Ein vorliegender Teil ist nicht vorhanden.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Gemelli. I. in erster Stirnlage. I. in zweiter Schädellage.	Blasenstich, worauf 7½ Liter mekonium- haltigen Frucht- wassers abfließen. Nach 30 Minuten Ein- stellung eines Kopfes in Stirnlage. Wegen schlechter Herztöne forceps. Gleich darauf Spontangeburt eines zweiten, tief asphyk- tischen Kindes.	Spontan, o. Bes.	Normal, Ödeme schwind. nach einer Woche.	Zwei lebende Knaben. Der zweite stirbt nach 24 Stunden.	Eineiige Zwillinge.
Hydramnion.	—	—	—	—	Gravida sucht einen anderen Arzt auf.
Hydramnion II. Schräg- lage. Partus prae- maturus.	Wehenbeginn am 25. VIII. Beim Blasenstich fließt mekoniumhaltiges Fruchtwasser in großer Menge ab. Wendung auf den Fuß, Extraktion.	Nachgeburt wird nach Credé exprimiert, ist o. Bes.	Normal.	Toter, mazerierter Knabe. Länge ent- spricht dem VII. Monat.	—
Hydramnion I. Schädel- lage.	Wehenbeg am 8./I. Beim Blasenstich fließen 8 Lit. Frucht- wasser in 3 Por- tionen ab. Wegen Bradykardie for- ceps am 9./I. die Rumpfentwick- lung durch Aszites stark erschwert. Frucht ist stark asphyktisch.	Spontan, o. Bes.	In den ersten Tagen fieber- haft, dann normal.	Leb. Knabe mit Aszites. Die Hoden befinden sich noch nicht im Skrotum.	—
Hydramnion II. Schädel- lage.	Wehenbeg. a. 8./II. Da die Geburt nicht fortschreitet, wird nach 34 Std. der Blasenst gemacht, wobei viel Frucht- wasser abfl. Der Leibumf. nimmt um 15 cm ab. Nach 10 St. Spontangeb.	Spontan, o. Bes.	Am 3. und 4. Tage Fieber bis 39°, dann normal.	Lebendes Mädchen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
61	546 1895/96	Fr. A. S.	25 J.	II	Hereditär = 0. Gravida war angeblich immer gesund, menstruierte regelmäßig. Der erste Partus war ein Abort.	Leib ist stark aufgetrieben mit nachweisb. Fluktuation. Herztöne sind nicht zu hören. Kindsteile nur undeutlich palpabel.
62	4 1896/97	Fr. A. J.	44 J.	XI	Hereditär = 0. Früh. Krankh. werd. negiert. Erste Regel mit 14 J., dann stets normal. Unter den 10 Partus erfolgte einmal eine Perforat. der Frucht, einmal Abort. Letzte Regel Ende Juni. In letzter Zeit fiel ihr das schnelle Wachsen des Leibes auf.	Mittelgroße Frau mit stark vorgewölbtem Leib. Palpationsbefund ist unsicher, kindliche Herztöne rechts unter dem Nabel. Kopf über dem Becken ballt. Blase steht. Wehen schlecht.
63	20 1896/97	Fr. P. S.	35 J.	IX	Vater ist an Rückenmarksleiden gestorben. Gravida war angeblich immer gesund. Sie hat 7 normale Partus und 1 Abortus durchgem. Den 11./IV. Wehenbeginn, d. 12./IV. Blutung aus den Genitalien.	Kräftige Frau mit sehr vorgewölb. Abd. Pat. gynec. u. gynec. patorischer Befund unsicher. Fluktuation im Bereich d. Uterus ist nachweisb. Kindl. Herztöne sind deutlich zu hören. Muttermund dreimarkstückgroß. Kopf über dem Beckeneingang beweglich. Blase steht. Wehen schwach.
64	50 1896/97	Fr. O. M.	22 J.	II	Hereditär = 0. Der 1. Partus erfolgte spontan, nach 8 Tagen stellte sich Wochenbettfieber ein. Letzte Regel am 16. September.	Mittelgr. Frau. Abd. 91 cm. Umf. Uterus sehr groß, sein Inhalt fluktuier. Muttermund fast völlig erweitert. Vorliegend. Teil ist auf d. linken Beckenschaukel abgewichen. Blase steht, daneben ist ein pulsloses Nabelschnurknäuel vorhanden.
65	169 1896/97	Fr. M. O.	33 J.	VIII	Hereditär = 0. Von 7 Geburten waren 4 normal und 3 Fehlgeburten. Die Kinder sind alle gestorben.	Leib sehr ausgedehnt. Ödem d. Beine. Kindsteile, Herztöne s. wahrnehmbar. Blase steht. Mutterm. völl. eröffnet. Kein vorliegender Teil.
66	230 1896/97	Fr. A. K.	27 J.	V	Hereditär = 0. Frühere Krankheiten, Menstruation o. Bes. Die früheren Geburten waren normal. Gravida klagt über Atemnot, Rückenschmerz, Schwellung der Beine.	Ödem d. Beine u. Vulva. Leib ist stark vorgewölbt mit nachweisb. Fluktuation. Kindsteile u. Herztöne nachweisb. Mutterm. für 4 Finger durchgängig. Blase steht. Wehen schwach. Im Urin ist Eiweiß u. Zylinder vorhanden.

Diagnose	G e b u r t	Nachgeburt	Wochen- bett	K i n d	Bemerkungen
Hydramnion Schädellage, (tiefer Querstand).	Der Kopf wird mit forceps entwick., d. Rumpfantwickl. ist weg. Aszitz, sehr schwierig. Frucht- wassermenge sehr erheblich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen, mazeriert, mit Aszites.	Luesverdacht.
Hydramnion I. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 2./IV. Nach 24 Std. erfolgt Blasenstich mit Abfluß von 3 Liter Wasser. Hierauf bessere Wehen u. Spontan- geburt nach 1 1/2 Stunden.	Spontan, Plazenta halb inver- tiert, sonst o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion I. Schädel- lage.	Beim Blasenstich fließt viel Frucht- wasser ab. Hierauf Besserung der Wehen, nach 2 Stunden Spontangeburt.	Spontan, Plazenta ist halb in- vertiert, sonst o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe. Gew. 5 kg, Länge 52 cm.	—
Hydramnion II. Stirnlage.	Wehenbeginn am 26./IV. Den 27. wird Blase punktiert. Fruchtwassermenge beträgt 4 Liter. Nach 1 1/2 Stunden erfolgt Spontangeburt.	Nachgeburt wird nach Credé ent- wickelt, sonst o. Bes.	Am 1. Tage Temp. von 38,7°, dann normal.	Toter Knabe.	Mißbildung, Anencephal.
Hydramnion II. Querlage.	Äußere Wendung auf d. Steiß, Blasen- stich. Viel Frucht- wasser. 1 Stunde später Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Nephritis, I. Schädel- lage, atonische Nachblutg.	Beim Blasenstich fließt sehr viel Fruchtwasser ab. Es setzen kräftige Wehen ein, nach 15 Min. erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, Länge 52 cm.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
67.	237 1896/97	Fr. A. L.	32 J.	IX	Unbekannt.	Unbekannt.
68.	278 1896/97	Fr. A. S.	27 J.	II	Hereditär = 0. Kreißende will außer Kinderkrankheiten nichts Besonderes durchgemacht haben. Erste Periode m. 17 J., trat dann regelm. auf. Letzte Menses unbek.	Stark vorgewölbt. Lei- sein Umf. betr. 110 cm. Im Bereich des Uterus deutl. Fluktuation. Kind- teile palpab. Herztöne deutlich. Muttermund fünfmarkstückgroß. Cervix verstrichen. Blase steht.
69.	454 1896/97	Fr. L. M.	42 J.	VIII	Unbekannt.	Wehen nicht vorhanden der Geburtstermin ist noch nicht erreicht. Muttermund f. 1 Finger durchgängig.
70.	491 1896/97	Fr. M. H.	20 J.	I	Hereditär = 0. Frühere Krankheiten u. 1. Periode unbek. Diese blieb stets regel- mäßig. Letzte Regel Anfang Juni.	Leib stark vorgewölbt. Daselbst Flukt. nach- weisbar. Uterus reich- bis 2 Querfinger unterhalb des proc. ensiformis. Kindsteile undeutlich palp., kindl. Herztöne gut zu hören. Wehen gut. Blase steht.
71.	501 1896/97	Fr. A. B.	38 J.	VI	Hereditär = 0. Frühere Geburten bis auf 1 Abort normal verlaufen. Letzte Pe- riode im April 1896. Um die Mitte der Schwangerschaft Wuchs der Leib auf- fallend rasch.	Leib stark aufgetr. Sein Umf. betr. 115 cm. Mäß. Anasarka der Beine. Kindsteile palp., kindl. Herztöne deutlich zu hören. Muttermund völlig eröffnet. Kopf überd. Becken bewegl. Im Urin wenig Album.
72	614 1896/97	Fr. C. B.	23 J.	II	Hereditär = 0. Gra- vida hat nur Kinder- krankheiten durch- gemacht. Menstruat. war ohne Besonderh. Letzte Regel Ende Juli. Die 1. Geburt verlief normal. Während der gegenwärtig. Gravid. wurde zu Beginn der- selben eine bestehende Retroflexio Uteri kor- rigiert. Den 31./III. plötzl. Abfluß von sehr viel Fruchtwasser ohne vorherg. Wehen.	Bis zur ärztl. Ankunft ist Kind bis auf den Kopf im Verlauf von 3 Wehen geb. worden. Kind inzwischen ab- gestorben. In Utero über der Symphyse ein abnorm groß. Kopf von weicher Konsis- tenz, palpabel. Dar- über noch Fluktuation als Zeichen noch vor- handenen Frucht- wasserrestes.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Schädel- lage, Retentio placentae.	Spont. Blasenspr., Spontangeburt der Frucht. Fruchtwasser- menge sehr erheblich.	Manuelle Plazentar- lösung 2 $\frac{1}{2}$ St. post. part.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion I. Querlage.	Wehenbeginn am 6./IX. Punktion d. Blase den 7./IX. Wendung und Herabholen eines Fußes. Wegen Ver- schlechterung der kindl. Herztöne bald darauffolgende Ex- traktion am Fuße. Kopfentwicklung sehr schwierig weg d. Größe d. kindl. Kopfes. Viel Fruchtwasser.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen. Länge 56 cm, Kopfumfang 37 cm.	—
Hydramnion II. Querlage.	—	—	—	—	Durch äuß. Wen- dung wird Kopf- lage hergestellt u. d. Untersuchte wieder entlass.
Hydramnion II. Vorder- hauptslage.	Blasenstich. 3 Lit. Fruchtw. Nach $\frac{3}{4}$ Std. Spontan- geburt eines kleinen Fötus.	Spontan, außer Plaz., die sehr groß ist, nichts Besond.	Normal.	Lebendes Mädchen mit Aszites u. Anasarka, stirbt nach 1 Stunde.	—
Hydramnion acutum, I. Schädel- lage.	Nach dem Blasen- stich Besserung der Wehen. Es fließen 10 Liter Fruchtwasser ab. Nach 2 Std. Spon- tangeburt eines asphyktischen Kindes.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Hydro- cephalus, Blutung inf. Atonie des Uterus.	Perforation des nachfolg. Kopfes vom Munde aus. Daraufhin gleitet Kopf spontan heraus.	Spontan, o. Bes. Hierauf ato- nische Blutung mäßigen Grades.	Normal.	Totes Mädchen.	Mißbildung; Hydrocephalus.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
73.	13 1897/98	Fr. A. H.	30 J.	VI	Hereditär = 0. Frühere Krankheiten unbekannt. Die drei ersten Geburten waren normal, 4. u. 5. waren Aborte. Letzte Regel unbekannt. Gegenwärtig Beschwerden durch die starke Auftreibung des Leibes.	Leib stark aufgetrieben. Im Bereich des Uterus deutliche Fluktuation. Außer Kopf, der über dem Beckeneingang palpabel, nichts palpabel. Kindl. Herztöne undeutl. Muttermund fünfmarkstück groß. Blase steht. Wehen schlecht.
74.	32 1897/98	Fr. M. L.	34 J.	V	Hereditär, frühere Krankheiten = 0. Frühere Geburten verliefen normal. Letzte Menses Anfang August 1896.	Starke Spannung u. V. wölbt d. Leibes. Fluktuation ist vorh. Von Kindsteilen nur Kopf über dem Beckeneingang bewegl. palpabel. Herztöne sind zu hören. Mutterm. fastvöllig eröffnet. Blase steht, Wehen trotzdem kein Fortschritt.
75.	39 1897/98	Fr. A. G.	28 J.	V	Hereditär, frühere Erkrankungen = 0. Der 1. Mann war lungenleidend. Die von ihm stammenden Kinder sind gesund. Bei den früh. Geburten war 1 mal Zangenentbindung, 1 mal Abort. Letzte Regel Juli 96.	Leib sehr umfangreich stark gesp. Ödem d. Beine. Die Frucht sehr bewegl. Im Bereich des Uterus ist Fluktuation vorh. Kindsteile palpabel. Herztöne gut. Mutterm. f. 1 Finger durchgängig. Blase steht. Im Uterus ist Eiweiß vorhanden.
76.	120 1897/98	Fr. A. W.	?	VI	Hereditär, frühere Krankheiten = 0. Erste Regel mit 14 J., von da ab regelmäßig. Der 1. Partus war eine Frühgeb., der 2. Partus eine Totgeburt, der 3. Partus wieder Frühgeburt. Der 4. Partus war normal, der 5. wieder eine Frühgeb. von 9 Mon. Letzte Periode war am 4. November 1896. Erste Kindsbewegung nach 5 Monaten gefühlt.	Mittelkräftige, leidlich genährte Frau. Leib gespannt, vorgewölbt. Sein Umfang beträgt 109 cm. Im Bereich des Gebärmutter ist Fluktuation nachweisbar. Kindsteile, kindl. Herztöne sind nicht wahrnehmbar. Muttermund unvollständig eröffnet. Blase steht.
77.	144 1897/98	Fr. N.	26 J.	II	Früher nie wesentlich krank gewesen. Hereditär = 0. 1. Periode mit 17 J., blieb dann regelmäßig. Kreißende wurde d. erstemal von einer Frühgeburt von 7–8 Mon. entb. Kind starb nach 3 Tag. Letzte Regel Mitte Sept. 1896.	Kräftige Frau mit Struma. Abdomen beträchtlich ausgedehnt (Umfang 110 cm.) Fluktuation daselbst deutlich. Kindsteile, Herztöne wahrnehmbar. Muttermund völlig eröffnet. Blase steht, ist praktisch gefüllt.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion I. Schädel- lage.	Nach dem Blasen- stich (4 Lit. Fruchtwasser) Besserung der Wehen. Nach 2 Stunden erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe	—
Hydramnion I. Schädel- lage.	Fixation d. Kopfes üb. d. Beckeneing., Blasenstich. (8 bis 10 Liter Fruchtw.) Nach einigen Min. erfolgt Spontan- geburt.	Spontan Pla- zentari. norm. Die Eihäute sind verdickt, ödematös. Nabelschnur ist normal.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion II. Schräg- lage.	Wehenbeginn am 21./IV. Nach 13 Std. erfolgt spontaner Blasensprung. Daran anschl. kom- binierte Wendung auf den Kopf. Bald darauf Spontangeb. Fruchtwasser sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Bigemini (Part. prae- matur.) Verzögerte Plazentar- lösung.	Wehenbeginn am 31./V. Blasenstich am 1./VI. Es fließt nur 1/4 Liter Fruchtwasser ab. Steiß tritt ein. Wegen Nabel- schnurvorfall und schlechter Pulsation Extraktion am Steiß. Nach 1/4 Stunde stellt sich 2. Blase, wird punktiert. Es fließen 4 1/4 Liter Wasser ab. Wegen Vorfall beider Arme bei Kopflage Wendung und Ex- traktion.	Manuelle Plazentar- lösung nach vergeblich. Credé drei Stunden nach dem Partus.	Normal.	I. lebendes Mädchen, oligohydram- niotisch, Gew. 1430 g. II. lebender Knabe, polyhydram- niotisch, Gew. 1650 g, stirbt nach 24 Stunden.	Zweieiige Zwillinge mit Oligo- und Polyhydramnie.
Hydramnion I. Schädel- lage	Wehenbeginn am 13./VI. Nach 24 Std. Blasenstich, da Geburt nicht vorw. geht. (Fruchtwasser- menge etwa 5 Liter.) Nach 2 Stunden erfolgt Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
78.	284 1897/98	Fr. B. S.	27 J.	II	Unbekannt.	Unbekannt
79.	404 1897/98	Fr. V. K.	30 J.	VII	Hereditär, frühere Erkrankungen = 0. Sechs früh. Geburten verliefen normal. Letzte Regel unbekannt.	Mittelgroße Frau m. stark gewölbt. Abdom. Kindsteile, kindl. Herztöne sind undeutlich wahrnehmbar. Muttermund eröffnet. Blausprungen. Kopf in Beckeneingang.
80.	424 1897/98	Fr. W.	25 J.	V	Hereditär, frühere Krankheiten = 0. Erste Menses mit 13 J., wiederholte sich dann regelmäßig. 3 Geburten verliefen normal, die letzte war mit Plazenta praevia kompliziert. Letzte Regel Mitte Februar 1897. Ende Juni fühlte sie die ersten Kindsbewegungen.	Mittelkräft. Frau. Abdomen stark aufgetrieben. Sein Umfang betrug 111 cm. Deutl. Fluktuation ist nachweisbar. Fruchtlag. nicht genau diagnostizierbar. Muttermund fünfmarkstück groß. Blase steht, inprall gefüllt. Wehenmäßig gut, schlechter Fortgang der Geburt.
81.	661 1897/98	Fr. P.	27 J.	IV	Hereditär, frühere Krankheiten = 0. Erste Menses unbek., trat dann regelmäßig auf. Letzte Regel Ende August 1897. Von früheren Geburten verliefen die beiden ersten normal, die letzte war eine Totgeburt infolge von Nabelschnurvorf. Den 25./III. 1898 erfolgt plötzlich Fruchtwasserabg. in sehr großer Menge. Hierauf treten Wehen und Blutung auf. Der Ehemann hat vor kurzem Gonorrhoe gehabt.	Mittelkräftige Frau m. noch stark vorgewölbt. Abdomen trotz des Fruchtwasserabgangs. Uterus reicht bis zur proc. xiph. Kindsteile sind deutl. palpabel. Herztöne sind in Nabelhöhe z. hören. Muttermund einmarkstückgr. Dasselbst fühlt man Plazentargewebe und ein klein. Eihautstück.
82.	4 1899/1900	Fr. R.	31 J.	III	Hereditär = 0. Früh. Erkrankungen ohne Belang. Zwei frühere Entbindungen verliefen normal. Letzte Regel Ende Juni 1898. Gravidä klagt üb. Atemnot, Rückenschmerzen, Schwellung d. Beine,	Mittelgr. Frau m. sehr vorgewölbt. Leib-Ödem der Beine. Im Bereich des Uterus nachweisb. Fluktuation. Kindsteile sind nicht palpabel. Kindl. Herztöne sind zu hören. Muttermund fast vollständig eröffnet. Blase steht. Kopf ballotiert über d. Beckeneingang. Wehen schlecht. Im Urin ist Albumen vorhanden.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
dramnion I. Querlage.	Spontaner Blasenprung, wob. sehr viel Fruchtw. abfließt. Dabei fällt d. rechte Arm d. querliegend. Frucht vor, Einkellung der rechten Schulter. Wendung und Extrakt. ein. toten Frucht	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe, Gew. 9½ Pf.	—
dramnion Schädel- lage.	Nach spont. Blasenprung Seitwärts-lagerung d. Kreiß. 1 Stunde später Spontangeburt. Fruchtwasser menge beträgt 5 Liter.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe. Gew. 4750 g.	—
dramnion Schädel- lage.	Wehenbeginn am 14./XI. vormittags. Blasenstich den 15./XI. abends. Es fließen 7—8 Liter Fruchtwasser ab. Hierauf Besserung der Wehen u. 1 Std. später Spontangeburt.	Nachgeburt wird nach Credé exprimiert.	Normal.	Lebendes Mädchen, stirbt 1 Std. nach der Geburt.	Sektionsbefund: Schleimpropf. in der Trachea. Vergrößerte Thymusdrüse.
dramnion Schräglage, Plazenta praevia lateralis.	Zur Weitererhalt. d. Gravidität zuerst konservatives Verhalten. Da Wehen u. Blutung wieder auftr., wird Hyster-eurynter eingelegt. Nach dessen Geburterf. Blasenstich, Wendung auf den Fuß u. Extrakt. Es fließt noch viel Fruchtwasser ab.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, stirbt bald darauf.	Mißbildung: Aneucephal.
dramnion Schädel- lage.	Beim Blasen-sprengen fällt Nabelschnur vor, daher Wendung u. Extrakt. Fruchtwasser sehr reichl. Kind sehr asphyktisch, Nabelschnur 3 mal um dessen Hals gewunden.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
83.	594 1899/1900	Fr. H.	30 J.	VII	Hereditär = 0. Früher hat Kreißende angebl. keine Erkrank. durchgemacht. Bei früheren Geb., die alle normal verlief., w. wiederholt viel Fruchtwass. gewesen. Letzte Reg. ist unbek. Wehen sind schwach, jed. verhältnismäßig sehr schmerzhaft.	Der Leib hat ein. groß. Umfang (115). Fluktuation ist deutlich nachweisbar. Uterus reicht zum proc. xiph. Kindsteile sind palpab., Herztöne nicht zu hören. Mund einmarkst. groß. Blase sehr groß. Kopf liegt vor.
84.	223 1900/01	Fr. S.	?	IV	Unbekannt.	Anasarka, Starke Ausdehnung d. Leibes. Deutl. Flukt. d. Kindsteile und Herztöne nur undeutl. w. zunehmen. Mutter fünfmarkstückgr. Blase steht, Kopf d. Beckeneing. bev. Im Urin Eiweiß. Zylinder vorhanden.
85.	317 1900/01	Fr. A. T.	32 J.	IV	Heredität, frühere Erkrankungen o. Belang. Kreißende hat zwei norm. Geburt. durchgemacht, zuletzt abortierte sie. Letzte Menses Mitte Febr. Seit 8 Wochen besteht starke Schwell. des Leibes.	Mittelgroße Frau, Umfang beträgt 100. Im Uterusbereich nachweisbare Fluktuation. Kindsteile Herztöne nicht wahrnehmbar. Mutter zweimarkstückgr. Blase steht. Es ist ein ballotierender vor. Wehen s. schle.
86.	362 1900/01	Fr. S.	33 J.	III	Hereditär = 0. Kreißende hat nur Kinderkrankheiten durchgemacht. Menstruation war regelmäßig. Letzte Regel unbekannt. Die früh. Entbindungen verlief. normal.	Unbekannt.
87.	495 1900/01	Fr. K.	30 J.	VI	Hereditär, frühere Erkrankungen außer Kinderkrankheiten ohne Belang. Die Periode erfolgte regelmäßig. Letzte Regel am 10. März 1900. Frühere Geburt. verliefen normal, die Kinder waren stets sehr groß.	Leib sehr vorgewölbt. Sein Umf. betr. 109. Deutl. Fluktuation. Bereich des Uterus Kindsteile sind palpabel, Herztöne deutlich zu hören. Mutter fast völlig eröffnet. Blase steht. Der liegende Steiß ist nach links abgewichen. Wehen sind gut.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Schädel- lage Part. prae- matur. (sens. VIII).	Nach der Blasen- punktion, wobei viel Wasser ab- fließt, Besserung der Wehen, gutes Fortschreiten der Eröffnungs- u. Ge- burtsperiode, so daß nach kurzer Zeit der partus be- endet ist.	Spontan. Es handelt sich um eine Plazenta marginata mit ring- förmigem Infarkt.	Normal.	Totes Mädchen mit Pemphigus universalis.	Ein Fall von wiederholtem Hydramnion. Sektionsbefund: Pneumon. alba, Hypertrophie v. Hepar u. Lien, osteocondritis syphilitica.
Hydramnion Schädel- lage Nephritis.	Spontangeburt nach Punktion der Blase. Es fließt viel Fruchtwasser ab.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion Bigemini.	Wehenbeginn am 7. IX. Nach 19 Stunden springt die Blase, wo- bei viel Wasser ab- fließt. Jetzig. Befund: Muttermund völlig er- weitert, pulslose Na- belschnur liegt vor. 2 Stunden später wird die erste Frucht, nach 5 weiteren Stunden die zweite tot geboren.	Manuelle Plazentar- lösung 2 St. postpartum nach vergebl. Credé. Die Plaz. erweist sich überall stark ad- härent, sonst o. Bes.	Wochen- bett fieber- haft, Tempe- raturen b. 38,7°. Das Lochial- sekret ist übel- riechend.	2 tote Knaben.	Zwillinge.
Hydramnion hemicephal	Bei Ankunft des Arztes waren Kind und Nachgeburt bereits geboren. Es flossen etwa 6 Lit. Fruchtwass. ab. Die Geburt erfolgte in 2. Gesichtslage.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe.	Mißbildung. Hemicephaler. (Totgeburt.)
Hydramnion Steißlage.	Wehenbeginn am 13. XII. Nächsten Tag spontan. Blasen- sprung. 1 1/2 Stunden später Abgang von Mekonium bei guter Herztätigkeit. Nach weiteren 1 1/2 Stunden plötzlich. Fehlen der kindlichen Herztöne, daher Exstruktion am Steiß mit stumpfen Haken.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen, Gew. 5000g.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
88.	63 1901/02	Fr. S.	29 J.	III	Hereditär = 0. Will keine besonderen Krankheiten gehabt haben. I. Regel mit 16 Jahren, seitdem regelmäßige Periode. Einmal spontane Geburt, einmal m. ärztlicher Hilfe wegen Querlage.	Große Frau. Leib vorgewölbt. Sein Umfang beträgt 113 cm. Fluktuation ist nachweisbar. Kindsteile sind palpab., Herztöne sind zu hören. Becken ist leer. Muttermunde handtellergroß. Blase steht, ein vorliegender Teil fehlt.
89.	188 1901/02	Fr. P.	35 J.	VI	Hereditär, frühere Erkrankungen = 0. Menstruat. war immer regelmäßig. Frühere Geburten verliefen normal. Letzte Regel Ende Septemb. Blase ist gesprungen. Es ist soviel Wasser abgeflossen, daß der Leib jetzt auf den halben Umfang zusammengefallen sein soll.	Atrophische Frau. dünn. Bauchwand u. Spitzbauch. Kindsteile sind sehr palpabel, kindl. Herztöne sind sehr deutlich zu hören. Muttermunde handtellergroß. Es steht Ödem der Vena und der Beine.
90.	57 1902/03	Fr. B. H.	28 J.	IV	Hereditär = 0. Früher nur als Kind krank gewesen. Die erste Periode mit 15 Jahren, dann stets regelmäßig. Die früher. Geburten waren normal. Letzte Regel Ende Juli.	Kräftige Frau m. stark vorgewölbt. Leib deutlich. Fluktuation daselbst. Uterus reicht zum proc. xiph. Kindsteile undeutl. palpabel. Herztöne nirgends hör. Muttermund fast völlig erweitert. Blase steht. Gesicht auf Beckenschaufel abgewichen. Wehen sehr schlecht.
91.	155 1902/03	Fr. E. L.	24 J.	I	Hereditär = 0. Kreißende hat Masern u. Blinddarmentzünd. durchgemacht. Die erste Regel mit 19 J., trat dann regelmäßig auf. Letzte Periode am 10. X. 1901, Kindsbewegungen wurden Ende Januar 1902 gefühlt. Der starke Leib macht der Kreißenden Beschwerden.	Mittelgroße, kräftige Frau mit stark aufgetriebenem Leib. Kindsteile sind gut palpabel. kindl. Herztöne sind undeutlich zu hören. 40—60 Schläge in Minute, aussetzen. Muttermund ist vollständig eröffnet. Die Blase ist gesprungen.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion I. dorso-poster. Querlage.	Auf Blasenpunktion fließt viel Fruchtwasser ab. Im Anschluß daran Wendung und Extraktion, die bloß bis zur Skapula gelingt. Kind stirbt ab, Perforation am nachfolgenden Kopfe.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe, Gew. 4000 g.	—
Hydramnion Schädel- lage, allgemein verengtes Becken mäßigen Grades. Atonische Nach- blutung.	Spontangeburt am 5. VII.	Nach vergeblichem Credé wegen Blutung manuelle Plazentar- lösung. Blutung hält im ver- stärkten Maße noch eine zeitlang an.	Fieber- haft bis 39°.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Gesichts- lage.	Wehenbeginn am 3. V. Blase wird nach 12 Stunden gesprengt (Fruchtwassermenge drei Liter, mekoniumhaltig). Hierauf bessere Wehen, 2 Stunden später Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen. Gew. 3000 g, Länge 48 cm.	Mißbildung: Hemicephalie.
Hydramnion I. Stirnlage. Atonische Nach- blutung.	Wehenbeginn am 20. VI. nachts. Nach 4 Stunden spontaner Blasensprung mit Abfluß von viel Fruchtwasser. Wegen Nichtfortschreitens der Geburt forceps. Rumpfentwicklung wegen Aszites schwierig.	Spontan, o. Bes. Hierauf ziemlich starke Nach- blutung.	Normal.	Totes Mädchen mit Aszites.	Sektionsbefund: fötale Peri- tonitis.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
92.	469 1902/03	Fr. M. H.	27 J.	IV	Hereditär = 0. Will stets gesund gewesen sein. Luetische Infektion wird negiert. Frühere Geburten verliefen normal. Letzte Regel unbekannt. In letzten Graviditätsmonaten häufige Blutungen aus den Genitalien.	Mittelgroße Frau stark gespannt, aufgetriebenem Leib. Bereich d. Uterus, z. Rippenbogen reich nachweisb. Fluktuat. Kindsteile nicht palpabel, Herztöne nicht zu hören. Muttermund dreimarkstückgroß. Blase steht. Steiß vorliegend. Temp. 38,3. Puls 104.
93.	544 1902/03	Fr. K.	?	II	Unbekannt.	Unbekannt.
94.	548 1902/03	Fr. A. K.	36 J.	XIII	Hereditär = 0. Früher hat Kreißende nur Kinderkrankheiten durchgemacht. Die zwölf früheren Geburten verliefen normal. Letzte Regel Mitte Februar 1902.	Leibesumfang beträgt 120 cm in Nabelhöhe. Leib ist sehr vorgewölbt. Im Bereich d. Uterus ist Fluktuation nachweisbar. Kindsteile sind undeutlich palpab., Herztöne sind undeutlich zu hören. Muttermund völlig erweitert, Blase steht
95.	578 1902/03	Fr. A. K.	27 J.	II	Hereditär = 0. Früher nur Kinderkrankheit, durchgemacht. Erste Menses mit 17 Jahren, wiederholte sich dann regelmäßig. Die erste Geburt verlief normal. Letzte Menses am 30. III.	Mittelgr., gut genährt. Frau m. stark aufgetriebenem Leib. Dasselbst Fluktuation nachweisbar. Uterus nach rechts abgewichen. Handbreit unterhalb des Nabels findet sich eine deutl. Einschnür. des Uterus. Kindsteile palpabel. Herztöne deutlich zu hören. Muttermund fast vollständig erweitert. Blase steht
96.	582 1902/03	Fr. M. K.	30 J.	I	Hereditär = 0. Von früheren Krankheiten nur Diphtherie bekannt. Letzte Regel am 8. IV. 1902. Seit 3 Monaten besteht Schwellung der Füße, seit 8 Tagen ist Nierenentzündung ärztlich festgestellt.	Leib ziemlich stark vorgewölbt. Umfang beträgt 119 cm. Ödem der Beine, der Bauchhaut. Kindsteile deutlich palpabel, Herztöne sind undeutlich zu hören.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion Steißfußlage (Part. praematur. Mens. II—VIII).	Blasenstich, daran anschließend Ex- traktion am Fuß. Fruchtwasser- menge sehr erheb- lich vermehrt.	Spontan, o. Bes.	Rasche Ent- fieberung nach der Ent- bindung.	Toter Knabe, mazeriert.	Lues. Osteochondritis syphilitica.
Hydramnion Gemini Schädellage I. Steißlage urt. praemat. (Mens. VII.)	Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Zwei lebende Knaben, die jedoch bald nach der Ge- burt starben.	Zwillinge.
Hydramnion Steißlage.	Wehenbeginn am 20. XII. Nach 24 Stund. wird Blase gesprengt, wobei sehr viel Frucht- wasser abfließt. Wegen schlechter, kindlicher Herztöne Herabschlag des vorderen Fußes und Extraktion eines asphyktischen Kindes.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe. Gew. 4500 g, Länge 58 cm. Schädel- umfang 39½ cm.	—
Hydramnion Steißlage. Krampf- wehen.	Nach dem Blasen- stich fließt viel Fruchtwasser ab. 3 Stunden später erfolgt Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes. bis auf die Plazenta, welche sehr groß ist.	Normal.	Lebender Knabe. Gew. 4500 g.	—
Hydramnion Nephritis Gemini.	7. I. Spontaner Blasen- sprung mit Abfluß von viel Fruchtwasser. Nach 2 Stund. Wehen- beginn. Den 7. und 8. Dauerkontraktion des Uterus. Weg. drohen- der Eklampsie forceps den 8. I. am ersten Kinde. Perforation des zweiten Kindes.	Manuelle Lösung nach vergeblich. Credé, sonst o. Bes.	Am Tage nach der Ent- bindung gestorb.	Lebender Knabe, totes Mädchen.	Zweieiige Zwillinge.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
97.	625 1902/03	Fr. H.	25 J.	III	Hereditär, frühere Krankheiten = 0. Frühere Entbindungen verliefen normal. Letzte Regel Anfang April 1902.	Stark vorgewölbt. Abdomen, dessen Umfang 108 cm. Kindsteile nicht palpabel. Herztöne sind nicht zu hören. Cervix entfaltet. Zwei Füße linker Arm, schlechtpulsierende Nabelschnur liegen vor.
98.	647 1902/03	Fr. A. G.	28 J.	V	Hereditär = 0. Bei der 1. und 4. Geburt trat Eklampsie auf. Die 2. und 3. Geburt verlief normal. Letzte Menses am 18. V. Kreißende klagt über Übelkeit, Brechreiz, Atemnot, Rückenschmerzen, Schwellen der Beine.	Abdomen ist sehr groß. Kindsteile sind palpabel. Herztöne sind in der Nabelgegend deutlich zu hören. Muttermund ist völligeröffnet. Kopf über d. Beckeneingang beweglich. Blase steht. Ödem d. Beine, d. Vulva. Im Urin Albumen, Zylinder vorhanden.
99.	63 1903/04	Fr. U.	29 J.	II	Hereditär = 0. Früher nur Kinderkrankheit, durchgemacht. Erste Menses unbekannt, trat dann immer regelmäßig auf. Erste Geburt verlief normal. Letzte Regel Anf. August 1902. Jetzt Rückenschmerz, Atemnot, Spannungsgefühl im Leibe.	Mittelgroße Frau von mäßigem Ernährungszustande. Leibesumfang 110 cm. Deutliche Fluktuation im Bereich des Uterus. Kindliche Herztöne an 2 Stellen m. verschiedener Schlagzahl zu hören. Cervix ist entfaltet. Blase steht.
100.	264 1903/04	Fr. H.	26 J.	II	Hereditär = 0. Als Kind hat Gravidarhachitis gehabt. Die erste Geburt verlief normal. Letzte Regel war Anfang November.	Frau mit mäßig aufgetrieben. Abdomen jedoch deutlich. Fluktuation daselbst. Kindsteile palpabel. Kindl. Herztöne dumpf. 140 Schläge pro Min. Cervix entfaltet. Blase steht. Conjug. diagon. beträgt 9 1/2 cm.
101.	265 1903/04	Fr. M. G.	36 J.	VIII	Hereditär = 0. Früher angeblich gesund gewesen. Frühere Geburten verliefen normal bis auf einen Fall von Abort. Letzte Menses unbekannt.	Sehr starker Leib, das selbst nachweisbare Fluktuat. Kindsteile schwer zu palpieren. Kindl. Herztöne deutlich. Muttermund ist fast völlig eröffnet. Blase steht, Kopf liegt vor.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion I. Fußlage Nabelschnurvorfall.	Wehenbeginn am 8. II. Bald darauf spontaner Blasenprung mit Vorfall der Füße u. Nabelschnur, die mit dem vielen Fruchtwasser herausgeschwemmt werden. Exstruktion schwierig, Kind ist bei der Geburt tot.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen. Länge 59 cm. Kopfumfang 37 cm.	—
Hydramnion Nephritis I. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 19. II. Blasenstich, worauf mehrere Liter Fruchtwass. abfließen. Nach einigen Stunden Spontangeburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Gemini I. vollkommene Fußlage, II. 2. dorso- posteriore Querlage.	Wehenbeginn am 23. IV. Blasenstich am 24. IV. Gleich darauf Exstruktion eines lebenden Mädchens, das leicht asphyktisch ist. Fruchtwassermenge normal. Nach $\frac{1}{2}$ Stunde wird die II. Frucht, die sich aus der Querlage zur Steißlage umgewand. hatte, durch Exstruktion am Fuß entwick. Hier sehr große Fruchtwassermenge.	Spontan, o. Bes.	Normal.	1 lebendes Mädchen. Länge 49 cm. Fruchtwass.-Menge: normal. 1 lebender Knabe. Länge 52 cm. Fruchtwass.-Menge: stark vermehrt.	Zweieiige Zwillinge.
Hydramnion I. dorso- anter. Querlage Pelvis angusta.	Wehenbeginn am 31. VII. Blasenst., wobei viel Fruchtwasser abfließt. Gleich darauf Wendung auf den Fuß. Hierbei fällt die fast pulslose Nabelschnur vor. Wegen Mißverhältnis v. Kopf u. Becken Perforation. Unt. Zug u. Impression des Kopfes wird die Entbindung vollendet.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Toter Knabe.	—
Hydramnion I. Schädel- lage.	Nach der Blasenpunktion ist die Entwickl. v. Kopf und Schultern wegen der Größe sehr schwierig. Fruchtwassermenge beträgt 3—4 Liter.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen.	Mißbildung: Hemicephalie.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	? para	Anamnese	Status
102.	541 1903/04	Fr. M. S.	43 J.	XVI	Hereditär = 0. Kreißende hat angebl. nur Kinderkrankheit. gehabt. Bei den 8 letzt. Geburten war stets ärztliche Hilfe notwendig, die anderen verliefen normal. Letzte Periode am 14. II. Die ersten Kindsbewegungen fühlte sie Mitte Juli.	Mittelgroße, kräftige Frau mit Hängebauch. Starke Varizen der Beine. Fundus Uteri reicht zum Rippenbogen. Kindsteile und Herztöne sind deutlich wahrzunehmen. Muttermund handtellergrößer. Blase steht, Wehe gut.
103.	728 1903/04	Fr. Bl.	40 J.	VII	Hereditär = 0. Früher angebl. nicht krank gewesen. Die früh. Geburten verliefen norm., worunt. einmal Zwill. waren. Letzte Regel Ende Mai. Vor 8 Tagen Blutung.	Stark ausges. Abdomen mit deutl. Fluktuation. Kopf ballotiert in der linken Uterushälfte. Steiß rechts oben in Fundus. Kindliche Herztöne sind deutlich zu hören. Muttermund eröffnet, Blase steht.
104.	789 1903/04	Fr. Kl.	42 J.	X	Unbekannt.	Leibumfang 113 cm. Im Bereich des Uterus nachweisb. Fluktuation. Derselbe reicht zum Rippenbogen. Kindsteile, kindl. Herztöne nicht mit Deutlichkeit nachweisbar. Muttermund handtellergrößer. Blase steht.
105.	193 1904/05	Fr. F. K.	38 J.	V	Heredität, frühere Erkrankungen ohne Besonderheit. Vier Geburten verlief. norm. Letzte Regel Anfang Oktober.	Mittelgroße Frau mit stark ausgedehnt. Leib. Dasselbst nachweisb. Fluktuation. Kindsteile palpabel, Herztöne deutlich. Prolaps der Vagina, Muttermund völlig eröffnet. Blase steht.
106.	327 1904/05	Fr. A. S.	32 J.	IX	Hereditär = 0. Als Kind Rhachitis gehabt. Alle früheren Geburten erfolgten mit ärztlicher Hilfe, darunter war einmal Abort. Letzte Regel unbekannt.	Leib stark gedehnt. Fluktuation ist vorhanden. Kindl. Herztöne sind zu hören, Kopfauf dem linken Darmbein befindlich. Muttermund fast völlig eröffnet. Blase steht. Conj. diagon. fast 10 cm.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion dorso-poster. Querlage.	Spont. Blasenspr., Abfl. von sehr viel Fruchtw. Wegen Abganges v. Meko- nium wird Extrakt. am Fuß gemacht. Kopf wird nach Veit-Smellie mit gleichzeitiger Im- pression entwick.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe, stirbt 1 1/2 Stunden später an Asphyxie.	—
Hydramnion I. dorso-anter. Querlage.	Blasenstich, Wen- dung u. Extradktion am Fuß mit gleich- zeitiger Impressio Capitis. Nabel- schnur um Hals u. Arm geschlungen. Fruchtwasser sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe, Gew. 4000 g, Kopfumfang 39 cm.	—
Hydramnion I. dorso-anter. Querlage.	Blasenpunktion, Wendung auf beide Füße u. Extradktion. Fruchtwasser- menge beträgt 10 Liter.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen, stirbt nach 10 Minuten. Gew. 2220 g, Länge 47 cm.	Mißbildung: Anencephalie.
Hydramnion II. dorso-anter. Querlage.	Nach spontanem Blasensprung Wendung auf den Fuß, Extradktion. Fruchtwasser sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion abgewichene II. Schädel- lage. Rhachitisch, plattes Becken.	Linkslagerung er- folglos. Blasenst., Wendung und Ex- tradktion am Fuß. Kopfwenticklung sehr schwierig. Viel Fruchtwasser.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe, stark asphyktisch. Stirbt nach 3/4 Stunden. Kopfumfang 38 cm.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
107.	338 1904/05	Fr. M. B.	39 J.	XII	Hereditär = 0. Kreißende will nur Kinderkrankheiten durchgemacht haben. Gravida abort. einmal, die übrigen 10 Geburten verliefen normal. Nur traten wiederholt Nachblutungen auf.	Leicht. Ödem d. Beine. Leib stark aufgetrieben im Bereich des Uterus. Fluktuat. vorhandene Frucht ungemein beweglich, Kindsteile palpabel, Herztöne deutlich zu hören. Muttermund eröffnet. Blase steht, Wehenge.
108.	373 1904/05	Fr. S.	34 J.	IV	Unbekannt.	Stark vorgewölbt. Leib mit Zeichen von Fluktuation im Bereich des Uterus. Kindsteile palpabel, Herztöne deutl. wahrnehmbar. Muttermund völlig eröffnet, Blase steht.
109.	90 1905/06	Fr. I. L.	25 J.	II	Hereditär = 0. Nur als Kind krank gew. Die erste Geburt erfolgte spontan, das Kind starb an Lebensschwäche. Letzte Periode war Mitte August 1904.	Kleine mittelkr. Frau. Leibumfang 104 cm. Uterus reicht zum Rippenbog., daselbst Fluktuat., nachweisbare Äußere Untersuchung wegen d. starken Spannung unmögl. Muttermund handtellergroß. Kopf tief im Becken. Blase steht.
110.	290 1905/06	Fr. T.	29 J.	VII	Hereditär = 0. Will nur Kinderkrankheiten gehabt haben. Frühere Geburt verlief. norm. Letzte Regel unbekannt. Gravida klagt über den sehr starken Leib u. geschwollene Beine.	Ödem d. Beine. Der Leib ist ungeheuer groß. Äußere Palpation unmöglich. Kindl. Herztöne nur undeutlich zu hören. Muttermund handtellergroß, Kopf in Beckenenge befindl. Blase steht.
111.	38 1906/07	Fr. K.	30 J.	VI	Unbekannt.	Unbekannt.
112.	746 1906/07	Fr. B. B.	39 J.	V	Hereditär = 0. Frühere Erkrankung werden negiert. 4 Geburten erfolgten spontan. Letzte Regel war Ende April.	Schlecht genährte, blasse Frau. Leichtes Ödem der Beine. Leibumfang 105 cm. Kleinere Kindsteile deutl. palpabel, Herztöne ebenfalls deutlich. Muttermund ist völlig eröffnet, Blase steht.

Diagnose	G e b u r t	Nachgeburt	Wochen- bett	K i n d	Bemerkungen
Hydramnion I. Schädel- lage.	Nach der Blasen- punktion, wobei viel Fruchtwasser abfließt, stellt sich der Kopfein. Nach $\frac{1}{2}$ Std. Spontan- geburt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion II. Schädel- lage.	Nach spontanem Blasensprung erfolgt Spontan- geburt. Frucht- wassermenge ist groß.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion I. Schädel- lage (tiefer Quer- stand). Atonische Nach- blutung.	Wehenbeginn am 18. V. Wegen Ver- schlechterung der kindlichen Herz- töne forceps am 19. V. Kind zyano- tisch. Frucht- wassermenge sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion II. Schädel- lage.	Spontaner Blasen- sprung mit Abfluß von viel Frucht- wasser. Wegen Verschlechterung der Herztöne forceps.	Spontan, Placenta hat lappiges Aus- sehen, sonst o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion Bigemini (Abortus mens. VI). Atonische Nachblutg.	—	Retention kleiner Pla- zentarteile, die manuell ent- fernt werden. Hierauf Nach- blutung, sonst o. Bes.	Normal.	2 tote Knaben.	Eineiige Zwillinge.
Hydramnion I. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 5. II. Spontaner Blasensprung am 6. II. Es fließt viel Fruchtwasser ab. Nach $\frac{1}{4}$ Stunde Spontangeburt.	Nachgeburt wird nach Crédé ex- primiert, ist o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
113.	98 1907/08	Fr. N. L.	34 J.	IV	Hereditär = 0. Kreißende will nur Kinderkrankheiten gehabt haben. Erste Periode mit 14 Jahren, wiederholt sich immer regelmäßig. Frühere Geburten verliefen normal. Letzte Regel Anfang August.	Mittelgroße Frau n stark gespannt. At Äußere Palpat. erg neben deutl. Fluktu die einzeln. Kindstei Herztöne sind in Nab höhe zu hören. I Frucht ist gut bewege Muttermund ist eröffn Blase steht, die lin Schulter liegt vor.
114.	421 1907/08	Fr. A. H.	26 J.	II	Hereditär = 0. Als Kind hatte Kreißende Masern und englische Krankheit. Bei der ersten Entbind. mußte d. Kind wegen Beckengeenge perforiert werden. Letzte Regel unbekannt.	Äußerlich weg. stark Spannung des Leibes nichts Bestimmtes palpabel. Kindl. Herztöne sind nicht zu hören. Promontorium ist g erreichbar. Der Muttermund ist völlig eröffn die Blase steht.
115.	444 1907/08	Fr. B. G.	32 J.	VII	Hereditär = 0. Früher will sie nie krank gewesen sein, die Menses waren regelmäßig. Frühere Geburten verliefen normal. Letzte Regel Mitte Dez. 1907. Seit einiger Zeit Schwellung der Beine. In den letzten Tagen mehrfach Blutung.	Mittelgroße Frau n stark aufgetriebene Abdomen und deutl. Fluktuation daselbst. Palpatorisch ist äußer nichts festzustellen Kindl. Herztöne sind nicht zu hören. Muttermund ist handtellergroß. Kopf liegt in Beckenmitte. Die Blase steht prall gefüllt.
116.	750 1907/08	Fr. A. P.	25 J.	II	Hereditär, früh. Krankheiten ohne Belang. Der Mann hatte vor 8 Jahren Lues. Der erste Partus war ein Abort im 5. Monat. Menses waren immer regelm., letzte Regel war Juni 1907. Seit einig. Wochen starke Schwellung d. Beine. Kurz nach d. Wehenbeginn am 3. II. 1908 war Blase gesprung. u. viel Fruchtw. abgefl.	Leib ist trotz Abflusses von Fruchtwass. noch stark aufgetrieben. Zeichen von mütterl. Lues fehlen. Kindsteile sind nicht palpabel. Kindl. Herztöne sind nicht zu hören. Aus der Vulva hängt der linke Fuß heraus, während der rechte in der Vagina fühlbar ist.
117.	775 1907/08	Fr. M. S.	26 J.	IV	Hereditär = 0. Früher nur Kinderkrankheit. durchgemacht. Früh. Geburten verliefen normal. Letzte Regel Ende April 1907.	Leib stark vorgewölbt. Flukt. ist vorhanden. Kindsteile sind palpabel. Herztöne finden sich am Nabel. Muttermund ist völlig eröffnet. Blase steht.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion I. dorso-posteriore Querlage.	Blasepunktion, Wendung und Ex- traktion am Fuß. Die abgeflossene Fruchtwasser- menge ist stark vermehrt.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion II. Schädel- lage, Pelvis angusta.	Nach der Blasen- punktion erfolgt Spontangeburt. Fruchtwasser- menge sehr reichlich.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
Hydramnion II. Schädel- lage, vorzeitige Plazentar- lösung.	Bei der Blasen- punktion fließt viel Fruchtwasser ab. Hierauf Besserung der Wehen, nach 10 Minuten Spon- tangeburt eines toten Kindes.	Expression der Plazenta nach Credé. Außergleich- zeitiger Ent- leerung groß. Menge frischen und geronnenen Blutes o. Bes.	Normal.	Toter Knabe.	—
Hydramnion I. Fußlage (Partus prae- matur. Mens. VIII).	Während eines vorsichtig. Extrak- tionsversuches wird die Frucht im Verlauf 1 Wehe plötzlich ohne Weichteilverletz. geboren. Es fließt abermals viel Fruchtwasser ab.	Nachgeburt wird nach Credé exprimiert. Plazenta ist sehr groß, die einzelnen Cotyledonen ödematös, wenig blut- haltig, sonst o. Bes.	Normal.	Totes Mädchen mit Aszites, Anasarka. Länge 44 cm.	Lues der Frucht. Osteochondritis syphilitica.
Hydramnion I. dorso- anteriore Querlage.	Äuß. Wendung auf d. Kopf, Blasenst. Kopf stellt sich ein. Weg. Wehenschw. u. schlecht. Herzt. forceps. Frucht- wassermenge groß	Wird nach Credé exprimiert, ist o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
118.	861 1907/08	Fr. E. K.	38 J.	IV	Hereditär = 0. Früher nur Kinderkrankheit. durchgemacht. Die Menses war. normal. Der I. Partus erfolgte mit Kunsthilfe, der II. spontan, d. III. Partus war eine Fehlgeburt. Letzte Regel am 15. VI. 1907.	Kreisende hat eine kon- genitale Atresia ani u. Recto-Vaginalfistel. Der Abdomen ist stark au- getrieben mit Zeichen von Fluktuation. Kindsteil sind nicht palpabel, Her- ztöne sind nicht zu hören. Muttermund ist zweimar- stückgroß, die Portio zapfenförmig. Die prä- gefüllte Blase steht.
119.	169 1908/09	Fr. Gr.	42 J.	XIV	Hereditär = 0. Außer ihrer Kinderzeit will sie nie besond. krank gewesen sein. Die 13 Geburten verliefen normal. Letzte Regel etwa Mitte August 07. Jetzt klagt sie über Atemnot, Kreuzschmerzen, starke Spannung im Leibe. Beim Blasensprung soll sehr viel Fruchtwasser abgegangen sein.	Der Leib ist nur mäßig aufgetrieben. Die Kind- teile sind deutlich palpabel, ebenso sind die Herztöne gut zu hören. Muttermund ist völlig erweitert. Kopf steht beweglich über d. Becken. Die pulsierende Nabel- schnur liegt in der Vulva.
120.	944 1908/09	Fr. O. R.	27 J.	III	Hereditär = 0. Hat nur die Masern ge- habt. Die früheren Entbindungen ver- liefen normal. Letzte Regel am 22. V. 1908. Wehen haben angebl. vor 8 Tagen begonnen.	Der Leib ist sehr hoch Fluktuation im Bereich des Uterus sehr deutlich. Trotzdem sind Kindsteile gut palpabel u. Herztöne deutlich. Muttermund ist dreimarkstückgroß. Die Blase steht. Der Kopf steht beweglich über dem Becken.
121.	12 1909/10	Fr. A. F.	33 J.	XII	Hereditär = 0. Kreisende kann nur Kinderkrankheiten angeben. Unter den 11 früheren Geburten waren 9 ausgetragene Kinder. Eines davon war polyhydramnio- tisch und wurde mit Hilfe der Zange geboren. Außerdem machte sie 2 Aborte durch und zwar 1 mit 6 Wochen und 1 ma- zeriertes mit 6 Mon. Letzte Periode war am 24. VII. Erste Kindsbewegungen fühlte sie Dezemb. 08. Seit 8 Tagen fühlt sie dieselben nicht mehr.	Schwächliche, an- ämische Frau. Leibes- umfang beträgt 104 cm. Es besteht Hänge- bauch. Die Frucht ist sehr beweglich, die einzelnen Teile gut palpabel. Kindliche Herztöne sind nicht zu hören. Der Mutter- mund ist handteller- groß. Die Blase ist erhalten. Wehen sind schlecht.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
Hydramnion l. Schädel- lage. Congenitale Atresia ani mit Recto- vaginalfistel der Mutter.	Beginn v. Krampf- wehen am 6. III. Blasensprung am 8. III. 5 Liter Fruchtwasser. Muttermund in- zwischen völlig eröffn. Da Wehen nachlassen, wird forceps angelegt.	Wird nach Crédé ex- primiert. Plazenta sieht zerfetzt aus, sonst o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen mit auffall. kurzem Hals, Anasarka universale und Aszites. Stirbt nach 5 Stunden.	—
Hydramnion l. hintere Hinter- hauptslage. Nabelschnur- vorfall.	Wendung auf die Füße, Extraktion.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion l. Schädel- lage.	Nach spontanem Blasensprung erfolgt Spontan- geburt. Die Frucht- wassermenge ist sehr groß.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebendes Mädchen.	—
Hydramnion l. Schädel- lage.	Wehenbeginn am 4. IV. 1909. Am 5. IV. Blasenstich, worauf 3 Liter blutig gefärbten Fruchtwassers abfließen. Jetzt Besserung der Wehen u. baldige Spontangeburt einer toten Frucht.	Spontan, Plazenta und Nabel- schnur sind stark ödematös.	Normal.	Totes mazeriertes Mädchen, Gew. 5000 g, Länge 54 cm. Anasarka, Aszites der Frucht.	Ein Fall von wiederholtem Hydramnion.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
122.	719 1909/10	Fr. M. R.	35 J.	VI	Hereditär = 0. Als Kind hat sie die Masern durchgemacht. Die Menstruation war regelmäßig. Von den Geburten verliefen 4 normal, einmal erfolgte Abort. Letzte Regel war am 6. V. 09.	Gut genährte Frau mit Struma u. Exophthalmus. Varizen d. Unterschenkel. Leib ist stark aufgetrieben mit nachweisbarer Fluktuation daselbst. Uterus reicht handbreit über den Nabel. Kindsteile palpabel, Herztöne undeutlich zu hören. Muttermund ist vollständig geöffnet, Blase steht. Becken ist leer. Conjugata fast 10 cm. Distanz zwischen Spin. iliac. 27 cm., die Cristae iliac. 29 cm.
123.	809 1909/10	Fr. P. K.	38 J.	XI	Hereditär = 0. Frühere Erkrankung. werden negiert. Gravida hat 6 normale Geburten und 4 Aborte durchgemacht. Ein Partus war mit Placenta praevia kompliziert. Letzte Periode am 6. VI. 08.	Starker Hängebauch mit starker Spannung des Abdomens. Kindsteile sind palpabel, Herztöne sind deutlich zu hören; diese sind regelmäßig, 120 Schläge in der Minute. Muttermund ist vollständig eröffnet, die Blase steht.
124.	146 1910/11	Fr. A. R.	26 J.	II	Hereditär = 0. Frühere Erkrankung. belanglos. Der 1. Partus war sehr schwer, erfolgte jedoch spontan. Menses waren stets regelmäßig. Letzte Menses war Juni 09.	Leib ist stark aufgetrieben. Fluktuation ist deutlich nachweisbar. Kindsteile sind palpabel. Herztöne über der Symphyse zu hören, regelmäßig 120 Schläge pro Minute. Muttermund vollständig eröffnet. liegt der linke Beckenbogen, die rechte Hand und eine pulsierende Nabelschnurschlinge vor.
125.	615 1910/11	Fr. Gr.	27 J.	III	Hereditär = 0. Kreißende hat erst mit 3 Jahren laufen gelernt. Die beiden erst. Geburten waren normal. Die Periode war stets regelmäßig, das letztemal am 6. V. 1910.	Kleine, blasse Frau mit sehr stark aufgetriebenem Abdomen. Palpatorischer Befund ist wegen der starken Spannung unmöglich. Herztöne rechts über dem Nabel. Muttermund ist eröffnet. Steiß und kleine Teile sind palpabel. Beckenausgang ist palpabel. Die Blase steht.

Diagnose	Geburt	Nachgeburt	Wochenbett	Kind	Bemerkungen
dramnion dorso- poster. Querlage Part. raemat. as. IX—X Pelvis angusta. rbus Base- dovii?	Wehenbeginn am 18. I. Am 19. I. Punktion d. Blase, wobei 3 Liter Fruchtwasser ab- fließen. Hierauf Wendung und Ex- traktion.	Spontan, bis auf die Nabel- schnur, welche nur 30 cm lang ist, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe.	—
dramnion abgewich. Schädel- lage. tonische Nach- blutung.	Wehenbeginn am 2. III. Am 4. III. Blasenstich, hierauf Wendung u. Extraktion, die wegen der Größe d. Frucht schwierig ist. Fruchtwasser- menge ist sehr bedeutend.	Spontan, o. Bes. Hierauf mäßig starke Nach- blutung.	Normal.	Toter Knabe. Gew. 5200 g, Länge 62 cm.	—
dramnion dorso- anteriore Querlage.	Wehenbeginn am 2. VI. Spontaner Blasensprung nach 7 Stunden. Frucht- wasser beträgt 5 Liter. Wendung auf den Fuß und Extraktion. Kopf folgt erst nach stark. Impression.	Spontan, o. Bes.	Normal.	Lebender Knabe. Länge 59 cm. Kopfumfang 39 cm. Stirbt nach einigen Minuten.	—
dramnion igemini art. prae- matur.) Steißlage. Querlage.	Wehenbeginn am 20. XII. Bald darauf Blasensprung. Nach 5½ Stunden ist erste Frucht m. manueller Hilfe geboren. Frucht- wassermenge normal. Hierauf wird II. Blase ge- sprengt, viel Frucht- wasser. Wendung auf den Fuß und Extraktion.	Spontan, o. Bes.	Normal.	2 lebende Knaben, beide schwächlich, etwa 40 cm lang, sterben im Laufe der nächsten Tage.	Zweieiige Zwillinge.

Lfd. Nr.	Journal-Nr. Jahrgang	Name	Alter	?para	Anamnese	Status
126.	664 1910/11	Fr. M. R.	36 J.	VI.	Hereditär = 0. Außer Kinderkrankheiten will Kreißende nichts durchgemacht haben. Unter 5 früheren Geburten waren dreimal spontane, einmal Querlage und einmal Abort. Menses waren regelmäßig, ohne Besonderheit. Letzte Regel im Mai 1910. Die ersten Kindsbewegungen fühlte sie im November 1910.	Mittelgroße Frau Struma, Exophthalm. Tachycardie (110). Temper. ist normal. das Abdomen stark ausgedehnt. Uterus reicht zum Rippenbogen, in seinem reich nachweisbar. Fluktuation. Kinderteile sind palpabel. Herztöne deutlich hörbar. Der Muttermund ist handtellergroß. vorliegender Teil f.
127.	710 1910/11	Fr. P. R.	33 J.	IV	Hereditär = 0. Menses waren stets regelmäßig. Letzte Regel unbekannt. Die früheren Geburten verliefen normal.	Mittelgroße, sehr kleine Frau, mit stark gewölbtem Abdomen. besteht ein Viti Cordis. Uterus reicht bis handbreit unterhalb des proc. xyph. Im Bereich des Uterus findet sich deutliche Fluktuation. Kinderteile sind palpabel. Herztöne rechts unterhalb des Nabels. Muttermund ist handtellergroß. Kopf sehr fest im Becken. Blase ist gesprungen, hiefloß angeblich sehr viel Fruchtwasser. Die Wehen sind schlecht.

Diagnose	G e b u r t	Nachgeburt	Wochen- bett	K i n d	Bemerkungen
Hydramnion Geminus Querlage. Corpus Base- dovii.	Wehenbeginn am 10. I. Nach 6 Stun- den wird die Blase punktiert, wobei viel Fruchtwasser abfließt. Gleich- zeitig fällt die Nabelschnur vor, daher sofortige Wendung und Ex- traktion am Fuß. Alsdann Sprengen der 2. Fruchtblase, wobei wieder viel Fruchtwasser ab- fließt. Wegen Querlage Wendung und Extraktion am Fuß.	Spontan, o. Bes.	Normal.	2 lebende Mädchen. I. Gewicht 2500 g, II. Gewicht 2000 g. Beide Früchte waren poly- hydram- nisch.	Zweieiige Zwillinge.
Hydramnion Schädel- lage. Dipositas, Vitium Cordis.	Wehenbeginn am 24. I. Die Blase springt spontan nach 27 Stunden. Jetzt Stillstand der Geburt. Zuerst ex- pektatives Ver- halten, am 26. I. wird wegen Ver- schlechterung kindl. Herztöne der forceps angelegt.	Spontan, o. Bes. bis auf eine abnorm lange Nabel- schnur (90 cm lang).	Die erst. 2 Wochen Fieber bis 39°, riechende Lochien, dann normal.	Lebender Knabe. Gew. 4000 g. Länge 56 cm. Kopfumfang 37 cm.	—

Vergleichen wir zunächst einmal das Verhältnis der vorher angeführten Hydramnionfälle mit der Gesamtzahl der auf einen Zeitraum von fast $17\frac{1}{2}$ Jahren entfallenden Geburten, so finden wir, daß unter 26189 Geburten Hydramnion in 127 Fällen beobachtet wurde oder $0,48\%$ aller Geburten bildete, ein Beweis, daß das Hydramnion nicht zu den alltäglichen Ereignissen des Geburtshelfers gehört. Noch seltener wurde Hydramnion an der Münchner Frauenklinik beobachtet, wo nach Federlein (Inaug.-Diss. München 1908) in den Jahren 1895—1906 Hydramnion nur in 20 Fällen zu verzeichnen war und nur $0,18\%$ der auf diese Zeit entfallenden Gesamtgeburten bildete. — Weit häufiger finden wir das Hydramnion bei Mehrgebärenden, als bei Erst- und Zweitgebärenden. So sind unter unseren 127 Fällen Primiparae 17 mal, Pluriparae 20 mal vertreten. In 2 Fällen fand sich keinerlei Angabe über die Schwangerschaftshäufigkeit der Kreißenden. Der Rest entfällt auf Multiparae. Ähnliches berichtet Max Clintock (Clinicals Memoirs on Diseases of women, Dublin, 1863, S. 376—391), der unter 33 Hydramnionfällen 5 Erstgebärende, 8 Zweit- und 20 Mehrgebärende fand. Schatz (Arch. f. Gyn. Bd. XIX) entdeckte unter seinen 10 Fällen nur 1 Erstgebärende, Sallinger (Inaug.-Diss. 1875) unter 81 Fällen 19 Erstgebärende. Winckel endlich (Handbuch d. Geburtshilfe II, 2) fand unter 12 Hydramnionfällen 2 Erst- und 6 Zweitgebärende. Als einen nicht unwesentlichen Grund für die auffallende Häufigkeit des Hydramnion bei Multiparen sieht Simpson (Centralblatt f. Gyn. Bd. VII) den infolge früherer Geburten herabgesetzten Tonus der Uterusmuskulatur an und hebt besonders hervor, daß jeder Tonusverlust des Gebärmuttermuskels auf Entstehung und Masse des Hydramnion von nicht zu unterschätzendem Einflusse sei.

Beachtung verdient ferner der Umstand, daß unter den 17 Erstgebärenden 7 Kreißende sich im Alter von 27 bis zu 38 Jahren befanden, daß bei 5 dieser älteren Primiparen die erstere Menstruation spät aufgetreten war und zwar 2 mal im 17., 2 mal im 19. und 1 mal sogar erst im 22. Lebens-

jahre. Federlein (Inaug.-Diss.) fand unter seinen 20 Hydramnionfällen 4 Primipare in einem Alter von 30 Jahren. In 2 Fällen war auch hier die erste Menstruation auffallend spät aufgetreten und zwar 1 mal im 19., das 2. Mal im 20. Lebensjahr.

Wenden wir uns nun zur Ätiologie unserer in tabellarischer Übersicht vorgeführten Fälle, so finden wir bei 2 Gebärenden die Ursache der Hydramnionbildung in einer ausgesprochenen Erkrankung des mütterlichen Herzens. In 2 weiteren Fällen finden sich neben schwerer Herzaffection gleichzeitig einmal eine abnorme Länge der Nabelschnur (90 cm), das andere Mal allgemeiner Hydrops der Frucht und der Plazenta, so daß hier möglicherweise die Quelle des Hydramnion auch außerhalb des mütterlichen Körpers in dem einen Fall in der abnormen Länge der Nabelschnur, im anderen Fall in Zirkulationsstörungen des Fötus zu suchen ist.

Bei 15 Kreißenden, welche Erscheinungen einer bestehenden Nierenerkrankung darboten, muß diese als Ursache des Hydramnion angesprochen werden. — Nicht unwahrscheinlich ist es ferner, daß im Fall 33 die vorgefundene, Kindskopfgroße, torquierte Parovarialzyste als Zirkulationshindernis zur erhöhten Transsudation nach der Amnionhöhle hingeführt hat.

Von weiteren ätiologisch in Betracht kommenden Ursachen finden wir bei 4 Gebärenden Zeichen chronischer Anämie, bei einer Gebärenden manifeste Lues, bei zwei anderen Symptome, die mit Wahrscheinlichkeit auf Lues hinweisen.

Bei 16 Multiparen endlich können wir den durch vorhergehende, zahlreiche Geburten geschädigten Tonus der Uterusmuskulatur für das Zustandekommen des Hydramnion verantwortlich machen.

Häufiger als im mütterlichen Körper treffen wir im Allgemeinen die Ursachen der Hydramnionbildung in Erkrankungen des Fötus und der Nachgeburtsteile. Unter 14 hydropischen Einzelfrüchten — eine davon wurde bereits

bei Besprechung der mütterlichen Herzkrankheiten erwähnt — können wir folgende Ursachen für die bestehenden Zirkulationsstörungen annehmen:

6 mal fötale Lues (3 mal mit gleichzeitigen Veränderungen der Plazenta).

1 mal fötale Peritonitis.

1 mal Leber- und Lungenerkrankung (nicht syphilitischen Ursprunges im Fall 7).

1 mal kongenitale Struma.

Bezüglich des Restes erfahren wir nur soviel, daß eine Frucht mangelhaft entwickelte Extremitäten und velamentare Nabelschnurininsertion aufwies, daß in einem zweiten Falle die Plazenta äußerst zerklüftet aussah, daß endlich ein drittes hydropisches Kind lebend geboren wurde.

Von Anomalien der Nachgeburtsteile, welche bei völligem Mangel an Krankheitserscheinungen bei Mutter und Kind als alleinige Urheber des Hydramnion anzusprechen sind, finden wir:

1 mal Plazenta mit stark ödematösen, schwammig aussehenden Cotyledonen.

1 mal Plazenta mit zahlreichen weißen Infarkten und kurzer Nabelschnur.

1 mal Plazenta mit Zeichen bestehender Entzündung.

1 mal Plazenta, welche stark hypertropisch ist.

1 mal erheblich verdickte, ödematöse Eihäute.

Auf Mißbildungen, deren häufiges Zusammentreffen mit Hydramnion auch unsere tabellarische Übersicht bestätigt, können wir Hydramnion in 15 Fällen zurückführen. Hiervon kamen 10 Mißgeburten tot zur Welt, 3 starben kurz nach der Geburt, 2 im Verlauf der ersten 24 Stunden. Nach der Art ihrer Mißbildung können wir die Fälle in nachfolgender Weise gruppieren:

4 Anenzephalie (1 mal mit starker Torsion der Nabelschnur).

4 Hemicephalie (1 mal mit Struma und starkem Exophthalmus).

2 Hydrocephale (1 mal mit sehr langer Nabelschnur).

- 1 Mißbildung mit Gaumenspalte und zwei großen schwimmhautähnlichen Hautfalten im Bereich des rechten Schulter- und Ellbogengelenkes, mit rechtsseitigem Pes varus und linksseitigem Pes valgus.
- 1 Mißbildung mit Verwachsensein von Occiput und Rücken und gleichzeitiger apfelgroßer, fluktuierender, von Kopfhaut umgebener Geschwulst, die in ihrem Inneren Hirnsubstanz enthielt.
- 1 Mißbildung mit Atresia ani, Phimose und Striktur beider Uretheren 1 cm unterhalb des Hilus.
- 1 Fötus mit stark hypertrophischer Thymusdrüse.
- 1 Fötus mit mannigfachen Mißbildungen, ohne nähere Angabe derselben.

Dem gleichzeitigen Vorkommen von Hydramnion und Zwillingsschwangerschaft begegnen wir in 18 Fällen und zwar 7 mal bei eineiigen Zwillingen und 7 mal bei zweieiigen Zwillingen. In den übrigen 4 Fällen fehlte leider eine Angabe, ob es sich um ein oder um zweieiige Gemini handelte. Unter den eineiigen Zwillingen, deren Zusammenhang mit Hydramnion nach den von Küstner und Schatz auf Grund ihrer anatomischen Befunde entwickelten und in der Einleitung erwähnten Theorien eine Erklärung findet, treffen wir 3 mal Polyhydramnie der größeren und gleichzeitige Oligohydramnie der kleineren Frucht, 1 mal Polyhydramnie beider Früchte an. 3 mal fand sich neben Polyhydramnie des einen Zwillings normale Fruchtwassermenge des anderen vor. Die bei eineiigen Zwillingen in zwei Fällen vorgenommene Obduktion ergab folgenden Befund:

Fall 14

- a) der größere polyhydramniotische Fötus. Etwas Aszites, starke Herzhypertrophie, harte verunstaltete kleine Leber, harte kleine Milz, sehr große Nieren,
- b) der kleinere oligohydramniotische Fötus normal.

Im Fall 26, wo es sich um beiderseitige Polyhydramnie bei fast gleich großen und schweren eineiigen Zwillingen handelte, lautete der Sektionsbefund:

- a) Anasarka, Hydrothorax, Hydropericard, Hypertrophie des linken Herzventrikels, Hyperämie von Leber und Milz. Letztere ist sehr klein.
- b) Starke Hyperämie von Lunge, Leber, Milz. Ekchymosen an Pleura und Perikard.

Beide Fälle erwecken insofern das Interesse, als ihnen eine große Ähnlichkeit bezüglich ihrer pathologisch-anatomischen Befunde mit den beiden von Küstner veröffentlichten Fällen von einseitiger Polyhydramnie bei eineiigen Zwillingen (Arch. f. Gyn. Bd. X und XXI) nicht abgesprochen werden kann.

Ein akutes Auftreten von Hydramnion wurde bei unseren eineiigen Zwillingen in 2 Fällen beobachtet, 2 weitere Fälle traten bei Einzelfrüchten auf. Stets handelte es sich um Multiparae im V. resp. VI. Graviditätsmonat, bei denen unter heftigeren subjektiven Beschwerden ein rasches Anwachsen des Fruchtwassers erfolgte. Nur in einem Falle einfacher Gravidität wurde die Frucht ausgetragen und zum richtigen Termin geboren, in den drei übrigen Fällen erfolgte ein Ausstoßen der Frucht bald nach dem Auftreten des akuten Hydramnion.

Bei den 7 zweieiigen Zwillingen und den 4 hinsichtlich ihrer Eiabstammung nicht näher bezeichneten Gemini konnte in 3 Fällen eine Veränderung der Adnexe nachgewiesen werden. Hierbei handelte es sich:

2 mal um entzündliche Prozesse der Plazenta,

1 mal um Hypertrophie der Plazenta und Ödem der Nabelschnur.

In Fall 126, wo die zweieiigen Früchte beide polyhydramniotisch waren und bei der Mutter Basedow festgestellt wurde, ist die Ursache des Hydramnion vielleicht in einer durch diese Krankheit bedingten Herzalteration der Mutter zu suchen, da Zeichen anderweitiger Erkrankung der Mutter, Veränderungen besonderer Art bei den Föten und ihren Adnexen fehlten.

Erwähnt möge endlich noch werden, daß bei drei Kreißenden Hydramnion zum zweiten Male aufgetreten

war. Eine derselben war luetisch, die zweite luesverdächtig, die dritte herzkrank.

In diagnostischer Beziehung bot, wie wir es an der Hand unserer Fälle gesehen haben, das Hydramnion kaum Schwierigkeiten. Schon die Angaben der Schwangeren über schnelles Wachstum und äußerst starke Spannung des Leibes, über erhebliche Kreuzschmerzen, Atembeschwerden, Schwerfälligkeit, Schwellung der Beine und Bauchwandung führen den Geburtshelfer häufig auf die richtige Diagnose, die durch den objektiven Befund wie abnorme Größe und Spannung des Uterus, daselbst nachweisbare Fluktuation und hochgradige Beweglichkeit der Frucht ihre Bestätigung findet. Häufig ist das Palpieren der kindlichen Teile, das Auskultieren kindlicher Herztöne sehr schwierig, zeitweise ganz unmöglich. — Differential-diagnostisch kommen an erster Stelle wohl Bigemini in Betracht, die ja nach unserer Statistik auch mit Hydramnion vereint recht häufig vorkommen. Die Möglichkeit einer weiteren Verwechslung des Hydramnion mit Ovarialzystomen und mit Aszites läßt sich durch sorgfältige Anamnese, genaue Inspektion des ganzen Körpers auf Zeichen bestehender Gravidität, eingehende bimanuelle Untersuchung mit großer Sicherheit vermeiden.

In wie reichem Maße der durch die Hydramnionflüssigkeit überdehnte Uterusmuskel Gelegenheit zur abnormen Einstellung der Frucht gibt, ersehen wir am besten daraus, daß wir unter 127 Hydramnionfällen 27 mal Querlage der Frucht antreffen. Schalten wir dabei die drei Fälle aus, wo wir die Querlage der gleichzeitig bestehenden engen Becken zuschreiben wollen, so finden wir dennoch in $16\frac{1}{2}\%$ der Fälle Querlage vor, während nach Bumm (Grundriß der Geburtshilfe) normalerweise etwa eine Querlage auf 200 Geburten vorkommt. In recht stattlicher Zahl sind auch Deflexionslagen verschiedenen Grades vorhanden, die, einen Fall von primärer Deflexion infolge Zusammenwachsenseins von Hinterhaupt und Rücken ausgenommen, immerhin $4,8\%$ der Gesamtgeburten bildeten. Eine auffallende Häufigkeit weisen schließlich auch die Becken-

endlagen auf, die hier 4 mal häufiger vertreten sind als bei Früchten mit normaler Fruchtwassermenge. In 12 Fällen trat infolge der herabgesetzten Re- und Kontraktionsfähigkeit des überdehnten Uterusmuskels eine mehr oder weniger heftige atonische Nachblutung auf, die in einem Fall zu einem Blutverlust von $2\frac{1}{2}$ Litern geführt haben soll. Wie wir aus den obigen zahlenmäßigen Zusammenstellungen ersehen, hängt die Prognose quoad vitam für die Mutter im wesentlichen von der richtigen Leitung der Geburt ab, ist also in der Hand eines erfahrenen Geburtshelfers nicht schlecht zu nennen. Unter den Ursachen, welche in unseren Hydramnionfällen den Tod von 4 Kreißenden herbeigeführt hatten, haben wir im Fall 96 eine Eklampsie zu verzeichnen. Hier wurde neben Hydramnion mit Zwillingsschwangerschaft gleichzeitig Nephritis und beginnende Urämie diagnostiziert und die Kreißende wegen drohender Eklampsie vom ersten Zwilling mit Hilfe der Zange, vom zweiten Zwilling nach vorhergehender Perforation desselben entbunden. Die Plazenta mußte nach vergeblichem Credé manuell gelöst werden. Am Tage nach der Entbindung starb die Wöchnerin im eklamptischen Anfall. Im Fall 23 handelte es sich um eine IV. Gebärende, welche mit den Zeichen bestehender Sepsis in die Klinik gebracht wurde und am gleichen Tage durch Wendung auf den Fuß und Extraktion entbunden wurde. Die Ausstoßung der Nachgeburt erfolgte mit Hilfe von Credé. Einige Stunden später erfolgte der Exitus der Entbundenen. Über den Fall 21 findet sich nur die Angabe, daß die Kreißende 35 Jahre alt und VIII Gebärende war, daß sie von zwei kleinen, toten Zwillingen entbunden wurde, daß die Plazenta manuell gelöst wurde und daß die Frau noch am Tage der Entbindung starb. Im Fall 33 endlich wurde bei der dreiunddreißigjährigen Erstgebärenden am 4. Tage nach dem Wehenbeginn wegen drohender Uterusruptur die Zange bei I. hinterer Hinterhauptslage angelegt und ein großes, lebendes Kind extrahiert. Die Plazenta wurde nach Credé exprimiert. Eine Verletzung der mütterlichen Geburts-

wege, eine nennenswerte Blutung hatte nicht stattgefunden. Trotzdem erfolgte nach 3 Stunden der Tod der Entbundenen, deren Obduktion außer einer Struma und linksseitiger, torquirter, kindskopfgroßer Parovarialzyste nichts besonderes ergab und zu keinerlei Klärung der Todesursache beitrug. —

Eine schlechte Prognose bieten dagegen die hydramniotischen Früchte dar, die teils verfrüht und lebensschwach, teils mißbildet und tot zur Welt kommen. Unter unseren 145 Neugeborenen haben wir 50 Totgeburten zu verzeichnen. Weitere 24 Kinder starben bereits im Laufe des ersten Tages, eins starb am dritten und noch ein anderes am 15. Lebenstage. Die schlechteste Prognose bieten nach unserer Statistik die Mißbildungen dar, von denen $\frac{2}{3}$ tot geboren wurde, $\frac{1}{3}$ innerhalb der ersten 24 Stunden starb. Ihnen am nächsten bezüglich der schlechten Prognose stehen die 14 eineiigen Mehrlingsfrüchte, von denen 8 tot geboren wurden, 5 bald nach der Geburt starben und nur eins am Leben blieb. — Weit besser ist die Prognose bei den 14 zweieiigen Mehrlingsfrüchten, unter denen wir nur 1 Totgeburt und 3 Todesfälle post partum zu verzeichnen haben, während die übrigen 10 zur Hoffnung auf normales Weitergedeihen berechtigten.

In wie reichem Maße Hydramnion durch schlechte Wehentätigkeit, Stillstand des Geburtsprozesses, abnorme Fruchteinstellung, Vorfal von Kindsteilen und Nabelschnur, mißbildete Föten, Retention von Nachgeburt ein aktives Verfahren von seiten des Geburtshelfers erfordert, dafür geben nachstehende Zahlen das beste Zeugnis ab. Ein Stillstand oder nur langsames Vorwärtsschreiten der Geburt infolge von Wehenschwäche machte in 59 Fällen den Blasenstich notwendig. Aus demselben Grunde, häufiger jedoch wegen Lebensgefahr des Kindes wurde die Zange in 13 Fällen angewandt. Abnorme Fruchteinstellung, Vorfal von Nabelschnur und Kindsteilen bei Schädellage, Gefährdung des mütterlichen und kindlichen Lebens erforderte in 31 Fällen die Wendung auf den Fuß mit an-

schließender Extraktion. In 14 Fällen von Beckenlage genügte einfacher Zug zur schnelleren Beendigung der Geburt, in 4 Fällen die äußere Wendung, um der Frucht die gewünschte Einstellung zu geben. Infolge eines Mißverhältnisses von Kopf und Becken wurde die Perforation der Frucht in 5 Fällen ausgeführt. Die Retention der Nachgeburt erforderte 22 mal das Credésche Verfahren, 8 mal erfolgte eine manuelle Lösung der Nachgeburt.

Der therapeutische Wirkungskreis bei Hydramnion ist ein sehr begrenzter. Außer Ruhe, Diät, Tragen geeigneter Leibbinden, außer einer Reihe symptomatischer Mittel zur Beseitigung der zeitweise recht großen Beschwerden ist die Blasenpunktion in all den Fällen indiziert, wo der Zustand der Schwangeren durch die abnorme Fruchtwassermenge und ihre Folgen ein gefahrdrohender wird.

Zum Schluß spreche ich Herrn Privatdozenten Professor Dr. Hannes für seine lebenswürdige Unterstützung bei der Anfertigung dieser Arbeit meinen ergebensten Dank aus.

Mein Lebenslauf.

Ich, Czeslaus Stelmachowski, wurde am 21. Juni 1881 als dritter Sohn des Baumeisters Wladislaus Stelmachowski zu Posen geboren. Ich bin katholischer Konfession, besuchte zuerst das Gymnasium zu Thorn, dann zu Graudenz, wo ich Ostern 1903 die Reifeprüfung bestand. Hierauf widmete ich mich dem Studium der Medizin an den Universitäten Berlin und München. Im Mai 1906 bestand ich das tentamen physicum in München, am 23. April 1909 die ärztliche Staatsprüfung in Berlin. Als Medizinalpraktikant arbeitete ich 9 Monate auf der inneren und 3 Monate auf der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Liegnitz. Juli 1910 trat ich als Assistenzarzt in die innere Abteilung des St. Joseph-Krankenhauses zu Breslau ein, woselbst ich bis zum Juli 1911 verblieb. Hierauf übernahm ich eine mehrmonatliche ärztliche Vertretung. — Während meiner Studienzeit hörte ich folgende Dozenten:

Die Herren *Waldayer, H. Virchow, Hertwig, Warburg, Mendel †, Busch, Gabriel, F. E. Schulze, v. Bayer, v. Voit †, Cremer, Rückert, Molier, Goebel, Oestreich, Kraus, Sonnenberg, Liebreich †, Hildebrandt, Lesser, Stoeckel, Bumm, Ziehen, Senator †, Passor, Rubner, Orth, Ohlshausen, Greeff, Heubner, Straßmann, Schmieden, Beitzke, Richter, Blumreich, Fränkel †, E. Meyer, Kroemer, Strauß.*

Mein Lebenslauf

Ich bin geboren am 1. März 1870 in Berlin. Meine Eltern sind Herr und Frau Schmidt. Ich habe zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren. Ich bin ein sehr ruhiger und bescheidener Mensch. Ich habe eine sehr gute Ausbildung erhalten. Ich bin sehr fleißig und gewissenhaft. Ich habe eine sehr gute Gesundheit. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Ich habe eine sehr gute Zukunft vor mir. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich bekommen habe. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf meine Ausbildung. Ich bin sehr stolz auf meine Gesundheit. Ich bin sehr stolz auf meine Glückseligkeit. Ich bin sehr stolz auf meine Zukunft. Ich bin sehr stolz auf alles, was ich bekommen habe. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf meine Ausbildung. Ich bin sehr stolz auf meine Gesundheit. Ich bin sehr stolz auf meine Glückseligkeit. Ich bin sehr stolz auf meine Zukunft. Ich bin sehr stolz auf alles, was ich bekommen habe.

Ich bin sehr dankbar für alles, was ich bekommen habe. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf meine Ausbildung. Ich bin sehr stolz auf meine Gesundheit. Ich bin sehr stolz auf meine Glückseligkeit. Ich bin sehr stolz auf meine Zukunft. Ich bin sehr stolz auf alles, was ich bekommen habe. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich bekommen habe. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr stolz auf meine Ausbildung. Ich bin sehr stolz auf meine Gesundheit. Ich bin sehr stolz auf meine Glückseligkeit. Ich bin sehr stolz auf meine Zukunft. Ich bin sehr stolz auf alles, was ich bekommen habe.

